



З клініки проф. Йордана в Кракові.

Про лічене рака роднищі вприскуванем extracti chelidonii majoris.

Написав Др. Марян Долинський.

В другій половині липня 1896 начальний лікар міського шпиталя в Брянську, Орловської губ. Др. Денисенко обявив новий неперативний спосіб лічення злобних новотворів, а спосіб той мав бути корисний навіть в тих случаях, де операція була просто неможлива. Замітки свої піддержує автор істориями недуг і чотирма фотографіями поданими в 34 ч. часописи „Врачъ“ з 22-го серпня ст. ст. 1896. Незвичайно добре результати, які одержав Др. Денисенко через свій метод, спонукали і проф. Йордана до практичного випробування того способу на своїй клініці, а я мав представити результати, які ми зібрали. Однаке я мушу з гори застеречі ся, що наша праця зовсім не рішаюча, бо малисьмо лише два случаї, з яких небудь виводів чи то за, чи против робити не можна. Порушую справу тілько через те, що вона дуже важна і пекуча.

Оба случаї, лічені тим методом на клініці проф. Йордана, представляли так далеко уже посунену справу хоробову (carcinoma cervicis uteri cum infiltratione neoplasmatica parametrii), що про операцію не можна було думати; по наведеню розпізнання, думаю, вільно мені лишити „status praesens“ без ніякої шкоди для самої річи.

Случаї ті лічили ми ось як:

Extr. chelid. maj.		що другий день по 3 cm ³ до вприскування
Aquaee destill.		
Glycerini		
20·0		що дня тампон до піхви всувати і що день змінити
Extr. chelid. maj.		
40·0		
Glycerini		20·0
20·0		
Extr. chelid. maj.		на внутр'єр через добу ужити
20·0		
Aquaee Melissae		
200·0		

Як видно, уживали ми розчинів цілком по припису автора, вприскувано, як він заоочує, в сам новотвір (опухоль) і то кождий раз в кількох місцях, аби впливати по змозі на як найбільшу частину рака.

Наші обсервації зовсім не годяться з вислідами автора, про котрі він згадує в своїх історіях недуг. Передовсім треба сказати, що уже само вприскування було дуже болюче, і то так, що в однім случаю хора не згодила ся уже на послідне (5) вприскування і через те цілком відступила від дальнішого лічення. У другої недужої, навченні першим дослідом, додавалисьмо до extr. chelid. maj., cocainei muriatici 1:4, т. 6. 1 cm³ } Cocaini 0·1 Aquaee dest. 10·0 на 4 cm³ висше наведеного розчину extr. chelid, що майже зовсім усувало болі при вприскуванні. Автор подає, що само вприскування є неболюче, але при раку родниці ми того не бачили. У обох недужих можна було бачити таки зараз по вприскуванню або в 1 до 1½ години значну горячку до 39·9°, а раз навіть 40·1°, до чого долчувалися сильні дроши і біль голови; але той стан минав по одній, а найбільше по двох годинах, і недужі заявляли лишень, що дуже втомлені; на другий день не жалувалися на нічо і чулися так добре, що могли вставати з ліжка і євобідно проходжувати ся.

Денисенко подає і звертає на то спеціально увагу, що по вприскуваннях extr. chelid. maj. новотвір в тих місцях зачинає витікати на верх і творить немов пучки півонії, котрі пізнійше зачинають розпадати ся на дрібної кусники, а в кінці цілком випадають зі свого оточення. Але сего, чи подібного образу ми ані раз не бачили, противно, лише лице новотвора по відпаданню знекроти-

зованого струпа виглядало живо-червоне, гранульовано чисто, і було дуже склонне до кровотоку.

Дальше подає Денисенко, що під впливом вприсненого extr. chelid. maj. ткань опуху зменшується і виразно зачинає відділяти від здорового м'яса. Того не можна було побачити, а майже зовсім цевно далося спостеречи, що рак розростається далі, хиба може трохи вільніше.

Тільки нашого спостереження, а тепер муши дещо і з других робіт в тім напрямі зазначити.

В літературі доступні мені найшов я досі лише дві згадки про лічене рака родниці „cum extracto chelidonii majoris“, а то: Кельбер, лікар Марійського шпиталля в Петербурзі, подав у „Врачу“ ч. 44. з 31. жовтня 1896, а A. Dhürsen в „Deutsche medicinische Wochenschrift“, ч. 49. з р. 1896 один случай. По Кельберу виходить що його случаї, котрі майже так само були трактовані як і наші, не закінчилися успішно, а проби їх можна назвати цілком невдоволяючими. Він подає лише самі факти і не ставляє п'яких висновків.

Dhürsen, котрий так само поступав як ми (usque ad cocainam), спостеріг під мікроскопом в куснику, що дістав з кусника рака вже по вприскуваннях, що на верху кровоносної судини знаходилося багато клітин новотвора. Він відносить се до механічного перенесення частин рака на голці при вколюванні нею, і бачить в сім велике небезпеченство того методу, бо рак в той спосіб швидше і певніше може розростати ся. Dhürsen ставляє метод Денисенка на одно з методом Emmerich-Scholl'a, котрі подали свою лічницю сироваткові проти рака.

До наших досвідів уживалисьмо Extr. chelid. maj. з фабрики Гелля в Опаві.