



ІНСТРУКЦІЯ

— — — для закладання дослідних піль — — —
з управою пашних рослин, сіножатий і пасовиск.

НАПИСАВ

Проф. АЛЕКСАНДЕР ГАРАСЕВИЧ

Голова рільничої Секції Краєвого Товариства господарского
„Сільський Господар“.

У ЛЬВОВІ.

З друкарні Івана Айхельберґера, Ринок ч. 10.



Інструкція

для закладання дослідних піль
з управою пашних рослин, сіножатий і пасовиск.

Головний Виділ краєвого Товариства господарського „Сільський Господар“, маючи на оці розвинути свою діяльність над піднесенем плекання худоби, рішив зайняти ся відповідно до призначених на се фондів збільшуванем продукції паші через розповсюднюванє між своїми членами управи рослин пашних а то бураків, моркви, люцерни, шведської конюшини, білої конюшини, еспарзети, сераделі, цукрового проса (сорґа) і кінського зуба, яких то управу наші хлібороби мало досі доцінюють, а також через розповсюднюванє управи сіножатий і запущених пасовиск.

Найуспішнішим середником до того в закладанє дослідних піль, які наочно дають можливість селянам переконатися, о скільки відповідна управа тих рослин як також управа сіножатий і пасовиск може причиняти ся до збільшення та поліпшення паші потрібної для кожного хлібороба, бажаючого стараннійше плекати свій товар. Тому Головний Виділ Краєв. Тов-а господарського „Сільський Господар“ призначив із своїх фондів значну часть на закупно насіння рослин пашних та штучних погноїв для безплатної їх розсилки з весною 1911 тим членам Товариства, що бажають на своїм поли заложити дослідні поля та зобов'язуть ся перевести на них управу точно після поданого поученя а відтак прислати Головному Виділові звіт з висліду управи.

Зголошувати ся до Товариства по насіння треба письменно найдалше до 10 марта (Львів, ул. Сикстуска ч. 46). В зголошеню належить подати виразно і точно:

1) імя і назвиско; — 2) місцевість замешканя; — 3) пошту; — 4) стацию залізничу; — 5) повіт.

Крім того треба, щоби на зголошеннях з тих місцевостей, де є Кружок господарський, виділ тогож Кружка потвердив, що зголошуючий ся єсть членом Кружка, бо зголошення будуть найскорше узгляднені з тих місцевостей, де є Кружки, так як они є доказом, що господарі згуртовані в Кружку справами господар-

ськими більше інтересують ся а тим самим всяку поміч і пораду з Товариства лучше зуміють вихіснувати.

Над точністю виконання управи на дослідних полях Головний Виділ вести-ме нагляд через свого вандрівного учителя а також через філіяльних люстраторів, призначених до сеї ціли, які будуть на місци переводити люстрації дослідних піль.

I.

Дослідні поля з управою пашних бураків.

З ростин пашних, мало ще у нас розповсюднених, найбільше заслугує на увагу управа бураків пашних. У всіх тих краях, де годівля товару стоїть вже на висшій степені розвою, особливо в напрямі молочности, а умовини кліматичні і почвы надають ся до розвою тої ростины, управа бураків веде ся на ширші розміри. Бураки тим цінні для годівлі, що достарчують на зиму много сочистої паші, яка до пізної весни дасть ся добре переховати, а додавані до сухої паші причиняють ся до збільшення єї поживности. Крім того і в осени листє бураків дає добру пашу а на зиму мож заквасити. У нас годівля товару передовсім не може тому як слід піднести ся, що наші хлібороби зимою кормлять товар переважно соломою, яка є дуже лихою пашею, а відповідний додаток бураків до січки і полови причиняв би ся значно до збільшення єї поживности і стравности.

Бураки удають ся у нас добре на всіх родах землі о глибокій засібній пчві. Поле призначене під бураки мусить бути добре згноєне. Найлучше є вичистити і гній приорати в осени а весною зрушити землю ралом або тяжкою бороною; але що так приготовленої рілі може бути на весну мало, то можна згноїти весною, але обірник має бути добре перегнитий. Обірника треба давати як найбільше, бо чим сильнійше знавожене поле, тим більші виростають бураки, отже праця, вложена при управі, добре виплатить ся

Коли ріля обісхне і остріє ся, тоді треба гній приорати а відтак добре зборонувати, щоб не було грудок, і брати ся до садження. Де уживають валка, то треба перед садженєм рілю звалкувати. Се діє ся звичайно при вчасній і теплій весні в першій половині цвітня. Перед самим садженєм треба насіне намочити в літній воді на одну добу, бо намочене далеко скорше кильчить ся в землі і сходить. Бураки садить ся рядами віддаленими від себе на 50 сантиметрів. Ряди значить ся значником, зробленим з дерева о трех зубах віддалених на 50 сантиметрів зуб від зуба. Значник такий може собі зладити легко кождий господар.

При значеню рядків треба значник добре притискати до рілі, щоби поробити рівці. В визначені рядки (рівці) кидає ся по 4—5 зернят що 18—20 сантиметрів прикриває насїне мїлкою землею і притолочує ся стопою. Ніколи не можна садити бураки за рискалем, бо прикинені трохи глибоше нероздробленою землею не сходять.

В погідну і теплу пору посаджені бураки посходять до 8—10 днів, а рядки зазеленіють ся від купок дрібних листочків. Тоді треба перший раз землю межі рядами плитко перемотичити (пересапати) щоб вичистити від щс-їно поростаючої хопти. Через вчасне зрушене землі бураки зачнуть скоро рости, так що в два або три тижні дістануть чотири листки а корінь набере грубости гусячого пера. Тоді треба зрушити землю другий раз мотикою вже глибоше, а бураки, вирастаючі купками, попроривати, оставляючи з купки лиш оден найліпше розвинений. Непопроривані, стиснені в купу, тримають ся малі, бо не мають місця, щоб розростати ся. При прориваню треба уважати, щоби не ушкодити полишеного до дальшого росту бурака.

Коли листє розросте ся так, що небавом буде покривати простір між рядами, треба пересапати ще третій раз і то, о скілько можна, глибоко зрушити землю довкола кожного бурака і вичистити всяку хопту.

Літом і осению не можна підривати листя бураків, як то часто роблять наші газдині годуючи листєм безроги або качки, бо через те корінь бурака не виросте великий. Збірка бураків припадає звичайно в жовтні. При збірці витягає ся бураки руками із землі, обчищує ся з листя, яке в стані зеленім становить добру пашу, або можна єго присушити під стріхою, щоб було до зими до подою, а також можна на зиму в долах заквасити. Обчищені від листя бураки складає ся на купу, прикриває ся тонкою верствою соломи та присипує ся землею. Також можна переховувати на купі в пивниці, коли не є за тепла.

Із сего поученя здає ся, що управа бураків вимагає много заходу і праці; однак така робота виплатить ся, бо бурак в добре згноєній рілі, при тім часто зрушуваний та чистій від хопти, вирастає великий а тим самим дає много паші, при тім на так справленім і вичищенем поли буде більший видаток і на слідуючий рік якої небудь наступаючої рости. Оден гектар в той спосіб справлений, видасть пересічно 500—600 сотнарів метричних бураків, що випадає 300—350 на морі. Недбала управа наражує господаря лиш на страту, бо бурак на рілі зле згноєній і захопченій не виросте. Під одно дослідне поле управи бураків треба призначити

10 арів*) т. є 1000 метрів квадратних і на тім просторі приготувати в повисше поданий спосіб рілю, засадити насінє, яке Головний Виділ Тов. „Сільський Господар“ на зголошенє безплатно пришле, та перевести управу точно після отсего поученя.

Бураки тим більший дають видаток, чим сильнійше поле в згноєне і то не лиш самим обірником але також кромі него і погноями штучними, які додають особливо в перших початках досить поживи молодій рости.

Щоби перекопати наочно наших хліборобів, як користно впливає навоженє землі штучними погноями на збільшенє видатку бураків, рішив Головний Виділ Тов. „Сільський Господар“ зголошуючим ся на дослідні поля управи бураків кромі насіня розіслати безплатно також штучних погноїв а то: 1) каїніту, що дає ростинам потасу; 2) суперфосфату, що дає фосфору і 3) чілійскої салітри, що дає азоту. Всі три погної треба дати лиш на одну половину дослідного поля т. є. на 5 арах (500 квадр. метр.), а других 5 арів остане без погноїв, щоби в той спосіб можна було порівнати, о скілько штучні погної вплинули на збільшенє видатку.

Каїніт ділає користнійше на розвій рости, коли розкине ся єго на рілю в осени, але що сего року вже не можливо то зробити, то треба єго дати з весною. На приоранім обірнику треба розсипати рівномірно по скибі каїніт та заборонувати; відтак розсипати суперфосфати і знов заволочити, щоби вимішав ся з землею.

Салітру дає ся пізнійше і то два рази. Перший раз посипує ся, коли бураки посходять, зазеленіють ся купками в рядах, а другий раз посипує ся між рядки зараз по прориваню купок. Салітри перед садженєм тому не дає ся, бо розпускає ся борзо у воді і дощі легко єї виполікують в глибокі верстви почви, звідки молода ростишка, слабо ще розкорінена, не могла би з неї користати. Салітру треба переховувати в сухім місци, бо она мокріє як кухонна сіль, а розсівати треба в сухий день.

Каїніту треба дати на 1 ар (100 квадр. метр.) по 4 кільоґрами отже на 5 арів (500 квадр. метр.) 20 кґр.; суперфосфату на 1 ар по 2 кґр. а на 5 арів 10 кґр.;

*) Оден ар має 100 метрів квадратних т. є 10 метрів вшир а 10 вздовж або 5 метрів вшир а 20 вздовж, 2 ари мають 200 метрів квадратних т. є 10 метр. вшир а 20 вздовж або 5 метр. вшир а 40 вздовж, 5 арів має 500 метр. квадр. т. є 10 метр. вшир а 50. вздовж або 20 вшир а 25 вздовж, 10 арів має 1000 метр. квадр. т. є 10 метр. вшир а 100 вздовж або 20 вшир а 50 вздовж або 25 вшир а 40 вздовж, так щоби метри вшир помножені через метри вздовж дали 1000. Сто арів = оден гектар т. є 10.000 метр. квадратних або 100 метр. вшир а 100 метр. вздовж, 1 морґ має 5754 метрів квадратних.

а салітри на 1 ар по 1 клр. або на 5 арів два рази по 2 і пів клр. Всякі роботи як садженє, розсїване навозів, сапанє треба виконувати одним днем.

Кайніт і суперфосфат доставляють фабрики лиш в 100-кільоґрамових міхах, тому лиш такі зголошеня буде Головний Виділ узглядняти, коли з одної місцевости зголосить ся членів на 10 або 20 дослідних піль, на які випадає якраз 100 клр. суперфосфату і 200 клр. кайніту. Чилійску салітру можна буде доставити в 50-кільових посилках.

В осени треба з окрема зібрати бураки з 5 арів знавожених обірником враз з штучними погноями а з окрема з других пять арів знавожених лиш обірником, по обчищеню з листя докладно відважити або вимірити одні і другі, щоб в той спосіб можна означити, чи і яка є ріжниця в видатку, а щоби опісля се не вийшло з пам'яті, найлучше собі записати, яка скількість була на одній переділці а яка в другій.

Відтак треба написати до Головного Виділу справозданє, в яким належить подати: на якого рода землі було заложене дослідне поле; яке положенє ґрунту, рівне чи похиле; що попередного року було на тім ґрунті посіяне і коли попередно згноєний; в котрім дни були розсипані кайніт і суперфосфат і коли бураки засаджені; коли салітра розсїяна перший раз а котрого дня еругий раз; чи було видко яку ріжницю на переділках з часі росту на око в літі; чи приїздив який делеґат в філії на люстрацію дослідних піль або учитель господарства з Головного Виділу і когрого дня; кілько вродило ся бураків на переділці знавоженій штучними погноями а кілько на знавоженій лиш самим обірником. Крім того дуже є вказаним подавати свої господарські вамітки і спостереженя

Щоб подати в звіті вірно всі повисші відомости, треба собі робити точні записки почавши від самої весни.

II.

Дослідні поля з управою пашної моркви.

Пашна морква достарчує много сочистої паші на зиму так як бурак і є знаменитим додатковим кормом до сухої паші для молодника а також для молочних коров. Що правда, не дасть она до весни переховати, бо зачинає гнити, тому треба її скормлювати в першій половині зими.

Морква росте добре на землях менше урожайних, легких глинках або пісковатих, де вже управа бураків

не надає ся, тому повинні селяни управляти на таких ґрунтах моркву.

Спосіб садження і управи моркви є подібний як управа бураків; она вимагає добре згноєної і чистої від хопти рілі, на піснійшій ґрунті удає ся на гною, на засібнійшій в другім рості по гною.

Моркву садить ся рядами віддаленими від себе 30—40 сантиметрів. Перед садженем треба насіне намочити через добу в літній воді, щоби скорше посходило. Коли морква в рядках зазеленіє, треба її попроривати, щоби не росла густо а обсапуванем не допустити до захопчення.

На одно дослідне поле треба вимірити пять арів т. є. 500 квадр. метр., на яких треба засадити насіне моркви, прислане з Головного Виділу та старанно після поученя перевести її управу. В осени по викопаню з землі належить моркву обчистити з гички та докладно відважити або вимірити, скілько на тих 5 арах уродило ся. Відтак треба прислати до Головного Виділу справозданє, в яким мають бути подані відомости: на якого рода землі було заложене досьвідне поле; яке положене ґрунту; що попередного року засіяно; коли попередно згноєне; чи приїздив який делеґат з філії на люстрацію дослідного поля або учитель господарства з Головного Виділу і котрого дня; кільки вродило ся моркви на 5 арах.

Зголошеня будуть узгляднювані лиш тоді, коли з одної місцевости зголосить ся членів Товариства що найменше на 10 дослідних піль.

III.

Дослідні поля з управою брукви.

Бруква єсть також цінною рослиною пашною на зиму; єї м'ясистий корінь є навіть поживнійший в сьвіжім стані як бураків. При тім менше вибаглива що до почви, удає ся на ґрунті більше вогкім, глинковатім або пісковатім о плиткій почві. Бруква заслуґує длятого на більше розповсюдненє в тих місцевостях, де є такі ґрунти.

Насіне засіває ся вчасно в розсаднику, можна враз з капустою, і так само опісля пересаджує ся в ради до 50 центим. один від другого та оброблює ся як капуста. Брукву можна садити з розсади досить пізно, тому надає ся она також н. пр. на засаджуванє тих місць, де пропали бураки або капуста.

Під брукву треба ґрунт згноїти на весні обірником. Видаток з 1 гектара доходить до 400—500 сотнарів ме-

гричних. Бруква є відпорна на приморозки, тому збирати з поля можна аж в падолисті. Переховувати ся на зиму дасть ся в кіпцях без соломи прикриваючи верствою землі около пів метра грубою.

На одно дослідне поле треба відміряти 10 арів т. є. 1000 квадр. метр., на яких треба з розсади пересадити брукву в рядках 45—50 цент. віддалених.

При збираню з поля треба брукву з листя обчистити та докладно відважити або відмірити видаток з тих 10 арів і прислати до Головного Виділу справоздане як повисше.

Зголошення будуть увзгляднені лиш тоді, коли з одної місцевости зголосить ся членів що найменше на 10 дослідних піль.

IV.

Дослідні поля з управою кінського зуба.

Кінський зуб єсть відміною кукурудзи, що росте в Америці і має зерна, осаджені на шульках, великі, подібні до молочних зубів у коня, від того пішла й назва. Доростає до значної висоти, у нас не дозріває а управляє се на зелену пашу із спроваджуваного з Америки насіння.

Селяни мало а по правді майже цілком не уживають сеї рослини, хоч она дає не лиш найбільше паші, але єсть також одна з найпізнійших зелених паш, отже віддає велику прислугу аж до зими.

Щоби кінський зуб дав як найбільше паші, треба старанно приготувати рілю, а то вичистити з хопти і сильно погноїти. Пісне поле дає скупу збірку. Зерно садить ся в рядах віддалених 30—40 цент., щоби заростаючу хопту висапати і зрушити землю (подібно як при кукурудзі).

Кінський зуб удає ся добре в сухім, теплім підсоню, якому відповідає наше Поділе, де часто в літі задля спеки та сухих вітрів дає ся відчувати брак зеленої паші. Кінський зуб садить ся не скорше як в другій половині мая, бо не зносить весняних приморозків. На більшім просторі садить ся частями що два тижні, щоби мати молоду пашу до зими.

При кормленю лучше тяти єго на кусники на січкарни; задаваний в цілости худоба задля грубости биля обгризає лиш єго листє. На зиму можна єго заквасити.

На дослідне поле під управу кінського зуба треба відзначити 5 арів т. є. 500 метр. квадр. та перевести на них управу після поданого способу. В справозданю до

Головного Виділу треба подати крім відомостей про рід ґрунту, положенє ґрунту, гноєнє, попередний засїв, також свої замітки і спостереження, о скілько кінський зуб заслугує на розповсюднюванє управи між нашим селянством.

Зголошеня по насїнє будуть узгляднені, коли з одної місцевости зголосить ся членів Товариства що найменше на 4 дослідні поля.

V.

Дослідні поля з управою сорґа або цукрового проса.

Сорґо є відміною проса. Виростає у нас до значної висоти, однак не дзриває майже ніколи; лиш в теплійших краях управляють єго на зерно. Управа єго у нас заслугує тим на увагу, що дає в літї много зеленої паші подібно як кінський зуб, а скошене дає другий покїс. Зносить добре посуху і вітри, отже надає ся до розповсюднюваня передовсім на Поділю. Сїяти єго треба в другій половинї мая, коли земля вже добре огріє ся та мине небезпека приморозків. Землю любить засїбну, вичищену від хопти і добре згноєну.

На дослідне поле треба призначити 5 арів т. є. 500 квадр. метр. В справозданю до Головного Виділу треба подати відомости як при кінським зубі.

Зголошеня по насїня будуть увзгляднювані, коли з одної місцевости зголосить ся разом членів Товариства що найменше на 10 дослідних піль.

VI.

Дослідні поля з управою люцерни.

До найважнійших ростин пашних належить люцерна, особливо для околиць з сухим теплим підсонєм. Она є рослиною многолітною, виростає до 75 цент. високо, а кошена кілька разів до року, дає дуже добру пашу зелену або суху. Єсть то рослина ввроваджена з полудня, у нас удає ся на пашу дуже добре, менше на зерно. Найлучше насїнє є продуковане у Франції.

Люцерна вимагає почви засїбної, глибокої та пропускливої, багатой в вапно. Також якість підпочви має незвичайний вплив на розрїст люцерни, понеже корїне єї розрастаєсь глибоко. Наколи корїне натрафить на щирий пісок або воду ґрунтову, тоді люцерна нагло жовкне, рідне і вже в другім або третім році гине.

При управі майже жадної рослини не є так конечна і пожадана глибока управа і старанне винищенє хоп-

ти як при люцерні. Найвідповіднійше проте місце буде по окопових ростинах, саджених на гною.

З кінцем цвітня а навіть з початком мая, коли ріля огріє ся, всїває ся насїне люцерни в овес або ячмінь, який становить охорону люцерни, та заволочує ся легко для прикриття насїня. На 1 гектар виходить около 35 кїльограмів насїня, а на 1 ар 35 дека, на 1 морґ около 20 клґр. Ростину охоронну треба сїяти рїдко і збирати на зелено, позаяк люцерна не любить довго рости в тіни.

В першїм році по засїві можна вже в осени косити люцерну, коли занадто вибуяла. Під жадним однак услївом не повинно ся пасти. Взагалї люцерниска не треба уживати яко пасовиска.

Найсильнїйше розвиває ся люцерна в третїм та четвертїм році по засїві і дає рїчно 4—6 покосів. В перших двох роках по засїві люцерна легко вимерзає в часї безснїжної острої зими, пізнїйше, коли глибоше розкорїнить, видержує мороз певно. Корисним проте є вкривати на зиму в тїм часї бараболинем або солом'ястим обїрняком, який однак на веснї треба згромадити.

В дальших роках є вказаним давати на люцерну каїніт і томасину через що збірка значно збільшає ся, з весною що року треба люцерну боронувати, бо в той спосїб повитягає ся нарастаючі бур'яни і спричинить ся бїльший приступ воздуха до почви а тим самим лїпший рїст люцерни. Так справлюване люцерниско треває до 8 лїт.

Люцерну косить ся вже в першїй половинї мая, отже в тїм часї передновку, коли ще нема нїякої зеленої пашї. Косити треба єї, заки зачне цвисти, бо пізнїйше скоро деревїє а тим самим тратить на вартости. При сушеню люцерни на сїно треба дуже уважати, щоб не стирало ся листє, яке є найбільше поживне.

На досвїдне поле треба визначити 10 арів т. є. 1000 метр. квадр., на яких має бути переведена після поученя управа люцерни.

В справозданю треба подати кромї вїдомости що до рода ґрунту і т. д., також чи люцерна розвинула ся в тїм році так, що в осени дала покїс, чи на зиму зістала прикрита. Щоби люцерна в слїдуючих роках добре розвивала ся, Головний Видїл пришле на слїдуючу осїнь томасину і каїніт для посипаня, щоби тим переконати ся о скїлько ті навози впливають на єї вїдаток.

Зголошеня будуть узгляднені, коли з одної місцевости зголосить ся що найменше членів на 10 дослїдних піль.

VII.

Дослідні поля з управою білої конюшини.

Біла конюшина є рослиною, що надає ся дуже добре до підсівання трав а передовсім пасовиска, бо відростає скоро та зносить придоптуванє а худоби не здуває. Росте добре навіть на лихім ґрунті пісковатім а також на звязкій глині о почві плиткій, коби лиш не за мокрій.

Білу конюшину добре всівати дуже вчасно весною в збіже на такім поли, яке хочемо призначити на слідуєчий рік на пасовиско. Так всіяна достарчує вже літом по збірці збіжа пашну стерню а відтак на слідуєчий рік добре пасовиско. На 1 гектар висіває ся для пасовиска около 10 кильоґр. а на 1 ар 10 дека, на морі около 6 кильоґр.

На дослідне поле треба призначити 20 арів т. є. 2000 метр. квадр. поля засіяного збіжем, в яке належить висіяти около 2 клґр. і 40 дека конюшини білої і лишити сей кавалок хоч на оден або два роки на пасовиско.

В справозданю до Головного Виділу треба буде подати кромі висше вимаганих відомостей також о скілько сего літа була лучша паша на стерни з білою конюшиною в порівнаню до стерні без конюшини.

Зголошеня будуть узгляднені, коли з одної місцевости зголосять ся члени хоч на два поля дослідні.

VIII.

Дослідні поля з управою шведскої конюшини.

Конюшина шведска подібна є до червоної, лиш цвіт має рожевий. Она є рослиною многолітною, надає ся яко домішка до конюшини червоної, наколи з тої не маємо збирати насія а призначуємо лиш на пашу, також надає ся яко підсів сіножатиї на ґрунтах вогких, глинястих або торфових. Сама конюшина засіяна дає лиш що року оден покіс а відтак слабо вже відростає.

На дослідне поле треба призначити 10 арів сіножати та підсіяти на ній вчасною весною шведску конюшину. На оден ар вийде висіву около 8 дека а на 10 арів 80 дека.

В справозданю треба подати, який ґрунт сіножати, на якій підсіяно шведску конюшину, котрого дня розсія-

но, чи була вже сего року в часі перших сінокосів яка ріжниця на підсіяній парцели чи в отаві.

Зголошення будуть узгляднені, коли з одної місцевости зголосить ся членів на 10 піль досьвідних.

IX.

Дослідні поля з управою еспарзети.

Еспарзета або дівойник є ростиною майже незнаною у наших хліборобів, а прецінь заслугує дуже на росповсюднене в деяких місцевостях, бо удає ся на сухих, в вапно богатих, скалистих ґрунтах, де конюшина вже не хоче рости. Еспарзета любить сонішне положенє і зносить посуху, підмоклого ґрунту не зносить. Росте кілька літ і дає що року оден покіс доброї і поживної паші а відтак і добре пасовиско до осени. Кормити можна або зеленою еспарзетою або сушити єї на сіно.

Еспарзета удає ся на пісній землі, однак потрафить вивдячити ся гарною збіркою за погноєне під попередну рослину. Всіває ся вчасно на весну в овес або ячмінь. Висіває ся на 1 гектар около 80 кильоґр. облущеного насіня, необлущеного около 200 кильоґр. Певнійше однак сіяти облускане, бо в лусках є много пустого насіня.

В першім році по збірці охоронної рослини не належить еспарзети косити ані пасти за то заплатить она обильним урожаєм в слідуючім році. В другім і третім році, коли належито розкорінить ся, розрастає ся буйно.

На дослідне поле треба відзначити 10 арів, добре вичистити від хопти та засіяти ячмінь або овес і заволочити а відтак розсіяти еспарзету та знов заволочити легко.

В справозданю до Головного Виділу треба подати відомости сеї осени, що до якости ґрунту, положеня, послідного гноєня, для засіву, люстрації а про ужиточність тої рослини треба написати аж на слідуючий рік в осени.

Зголошення узгляднить ся, коли з одної місцевости зголосить ся двох членів.

X.

Дослідні поля з управою сераделі.

Рівнож дуже мало є знаною у нас сераделя. Она удає ся на убогім, пісковатім, вогкім ґрунті; сухого ґрун-

ту не зносить. Є то рослина однорічна, що достарчує много поживної паші, яку можна скормлювати на зелено або сушити на сіно, надає ся також дуже добре на зелений погній.

Сераделю засіває ся або саму, або всіває ся вчасно на весні в жито або овес та прикриває ся легко бороною.

В початковім розвою, заким витворить сильне коріне, розвиває ся она на верхни землі дуже поволи, зачинаючи скорше рости аж в другій половині червня і липни. Через те всяка хопта дуже її переростає. Тому треба сераделю сіяти в поли добре вичищенім з хопти, а передовсім з перію, найлучше по ростинах окопових.

Коли сераделя посіяна сама, то в серпни збираєсь її на сіно, почім відростає та дає на осінь або добре пасовиско або навіть покіс зеленої паші. Всіяна в жито, або овес розростає ся добре аж на стерни та дає на осінь зелену пашу або зелений погній.

Часом не удає ся сераделя відразу, коли її впровадити до господарства. Причиною сего буває брак в землі бактерій, що розгнізджують ся в бородавковатих наростах сераделі та достарчують їй з воздуха азоту.

Зарадити можна тому в той спосіб, що рілю, призначену перший раз під управу сераделі, посипує ся землею взятою з поля, де попередно вже сераделя добре росла, для перещіплення тих бактерій. Коли же такого поля близько нема, треба на осібнім малім куснику засіяти сераделю і старанно управляти, н. пр. через два роки, на тім самім місци, почім землею з того кусника посипувати поле обсіване сераделею.

Д. обсіяння 1 гектара виходить 40 до 50 кильоґр. насіня а на 1 ар 40 до 50 дека.

На дослідне поле треба призначити 20 арів т. є. 2000 метр. вкадр., добре вичищених з хопти і засіяти на них саму сераделю на сіно або всіяти в жито чи овес, щоб на осінь мати пашну стерню.

В справозданю треба подати кромі загальних відомостей також чи була сераделя засіяна сама, чи всіяна в збіже і які користи були з неї та чи заслугує на розповсюдненє її управа на вогких пісковатих ґрунтах.

Зголошеня будуть узгляднені, коли з одной місцевости зголосить ся хоч двох членів на заложенє дослідних піль.

XI.

Дослїдні поля з управою сіножатий.

Поученє буде подане пізнійше, так як управа сіножатий вимагає приготовленя в осени.

Дослідні поля з управою пасовиск.

Пасовиска мають велике значінє для годівлі худоби. Товар, що літом пасе ся, стає задля сьвіжого воздуха і руху далеко здоровійший а молодник красше розрастає ся, коли противно держанє в стайни спричиняє ніжність організму і брак відпорности на хороби особливо чахотку (сухоти). При тім молода відростаюча трава на пасовиску дає пашу богату в найпоживнійший складник — білковину.

Тому то в краях, де годівля розвинена, зрозуміли селяни значінє пасовиска та через відповідну управу старають ся піддержати на них буйний ріст трави. Тимчасом у нас нераз значні простори землі, уживані на пасовиско, особливо яко спільна власність громадян, через брак всякої управи покривають ся що раз густійше мохом та купинами кертовиня, ріст трави зменшає ся а пасовиска стають ся радше неужитками в порівнаню до свого простору.

Для піднесеня їх ужиточности конечно треба впровадити на них відповідну управу, щоб при єї помочи знищити мох, зарівнати купини та спричинити буйний ріст трави.

Але на підмоклих пасовисках, де більшу часть літа кисне вода, задля чого ростуть kwasні трави, не принесе хісна жадна управа.

Треба з них перше спустити воду, аж відтак управляти. Та Виділ краєвий удержує окремо т. зв. бюро мел'орацийне, яке переводить відводненє пасовиск а край і міністерство рільництва призначують що року значні підмоги на ту ціль, отже туди треба звертати ся о поміч через наше Товариство.

Але у нас є запущені пасовиска, що не мають надмірної вогкості, і ті дало би ся поліпшити через відповідну управу, яка однак вимагає не так великого вкладу праці ані коштів як радше доброї волі громадян.

Управа полягає на переорюваню пасовиска та оброблюваню через кілька літ засіваних на нїм ростин в ціли вигубленя моху, зрівнаня купин, знавоженя, та спухченя затолоченої верствї землі, а відтак на засіві на обробленім так ґрунті пашних сумішок, переважно трав, для дальшого ужитку громадян.

Коли би де на пасовиску вже в сїм році мала зачати ся управа, то треба поступити найлучше в слїдуючий спосіб:

Сего літа з'орати два або три рази та виробити рілю під засів озимини (найлучше жита), по озимині посадити в гною окопові ростины, бараболю або кукуру-

дзу, потім засіяти овес або ячмінь та всіяти сумішку конюшини (переважно білої) з травами, які перший рік косить ся на сіно, а в другім році, коли трави більше розростуть ся, віддає ся знов на пасовиско.

В той спосіб справлене, буде пасовиско від сеї весни за пять літ покрите буйною і вкусною пашою та віддане до ужитку.

Можна також замість озимини посіяти ще сеї весни мішанку н. пр. овес з викою. Але треба хоч два рази з'орати, та добре заволочити, бо в разовині мішанки доброї не буде, відтак на слідуєчий рік засадити в гною окопові рослини а позім овес або ячмінь враз з сумішкою конюшин з травами. В такий спосіб буде пасовиско справлене та віддане до ужитку, рахуючи від сеї весни вже лиш за чотири роки.

Ще лучше є через два роки по собі управляти окопові рослини, бо тоді ще ліпше вигубити ся мох та сплхчить ся верхню верству.

При такій управі дуже добре для знавожуваня подають ся штучні погної як томасина і каїніт.

Розуміє ся, що управу на цілім пасовиску відразу тяжко у нас перевести, длятого треба що року якусь часть на то призначити.


Щоби дати заохоту нашим громадянам до управи заупущених пасовиск Головний Виділ „Сільського Господаря“ рішив заняти ся закладанем дослідних піль на пасовисках, де би переводилась того рода управа.

На дослідне поле треба призначити 1 гектар т. є. 10.000 метр. квадр. або 100 арів або морі і три чверти пасовиска.

На справлене сего гектара Головний Виділ „Сільського Господаря“ доставить потрібного насіння і погноїв та буде вести управу через весь час під своїм зарядом через фахового інструктора.

В зголошеннях на дослідне поле з управою громадського пасовиска, яке належить надсилати найдалше до 1 цвітня с. р., треба долучити ухвалу Ради громадської рішаючу відступити на ту ціль 1 гектар пасовиска.

Всі інші зголошення на дослідні поля з управою повисше згаданих рослин треба надсилати найдалше до 10 марта с. р.



КУКУРУДЗА КАРЛИЧОК

(Nanerottolo).

Написав

Др. Г. ВЕЛИЧКО.



Л Ь В І В 1913.

Накладом Краєв. господ. Тов. „Сільський Господар“ у Львові.

З друкарні „Діла“ Львів, Ринок 10.



Кукурудза єсть нині найважнішим збіжем на сьвітї. До недавна живилось найбільше людей рижом і пшеницею, але на низинах Міссіссіпі і по всіх теплійших краях запановує чим раз більше управа кукурудзи і нині станула она на першім місци.

Кукурудзі сприяє теплійше підсонє. В Европі управляють єї в краях наддунайских, в Італії, полудневій Франції, в вогкійших сторонах піринеяского півострова, в Бесарабії і прибережнім поясі полудневої Росії, але управа єї єсть так поплатна, що навіть в холоднійших краях старають ся єї завести.

В Галичині єсть, кукурудза головним збіжем в полуднево східнім кутї, отже на Покутю і примежних частях полудневого Поділя, але помалу управа єї розширилась горі Дністром чим раз дальше за північний захід і розшираєсь помалу а постійно по обох боках Дністра до півночи і до полудня та можна на певно сказати, що надійде час, коли она розповсюднить ся по цілій східній Галичині, навіть на холоднім північнім Поділю і на Підгірю.

Головною перешкодою при управі кукурудзи в нашім краю єсть підсонє, брак достаточного тепла через довший час. Кукурудза єсть дитиною з теплих сторін Америки і на весні можна єї садити аж в маю, коли можна надїяти ся, що при-

морозків не буде. В осені у нас наступають приморозки вже не раз в вересні і убивають часто кукурудзу, заки зерно дозріє, так що звичайні роди кукурудзи у нас найчастіше заводять і кому кукурудза раз не дійшла, той знеохочує ся і не хоче її більше управляти.

Як би так обмежити ся на неуспішні досьвіди, то управа кукурудзи лишилась би тільки в полуднево-східній частині Галичини, де кулеша або мамалига, чир та малаї суть головною поживою селян а по інших частях Галичини плекали би кукурудзу виімково по городах в сонічній виставі, більше до ужитку на ярину або великі роди кукурудзи, як кінського зуба, на зелену пашу.

Тимчасом користи з управи кукурудзи такі великі, що жадне інше збіже її не може заступити. З зерна роблять муку і крупи, листе і била йдуть на пашу для худоби, а качанами палять в печі. А що кукурудзу садять чи сіють досить густо і она пускає парости, то при оброблюваню проривають за густий посів, обломлюють непотрібні парости, пізнійше зжинають верхи бил і мають через довгий час дуже смачну зелену пашу для коров. Дальше садять наші селяни межи кукурудзою звичайно коловатні і фасолю пішу та гарбузи а часом капусту або бураки і мають крім кукурудзи поважний бічний додаток. Поле під кукурудзу управляєсь старанно, так неначе би під город, що незвичайно корисно впливає на пізнійші засіви. Колиж ще додати, що зерном і мукою тучать ся знаменито свині а цілим зерном або змеленим на грубо можна годувати коні замість вівса і дріб, то кожний зрозуміє, що таку благодатну рослину повинно ся розширювати по всіх усядах, де лише можна.

А чи можна у нас скрізь, навіть в холоднійших сторонах Галичини поза Покутем і Надністровем розводити кукурудзу?

Можна, але не звичайні високі роди жовтої та білої кукурудзи а кукурудзу дрібну, дуже вчасну.

Практичні Американці давно вже приспособили собі через добір вчасний рід кукурудзи і управляють її навіть в холоднійшій від нашого краю Канаді.

Кукурудзів єсть безліч всіляких як що до росту і величини та барви зерна, так і що до часу дозрівання а коли не звертаємо уваги на барву зерен, то можна їх умістити в чотирох розділах:

1. Звичайна, середно висока, дозріваюча досить пізно а у нас непевна.

2. Великанська, яка у нас не доходить, а коли би через висів в інсектах і пізнійше висаджене можна дійти до зерен зрілих, то они тратять свій ріст великий. Сюди належать звісні у нас наші кукурудзи, звані кінським зубом. Єсть кінський зуб угорський, африканський з Наталю і Капляндії, кавкаський і американський з Вірджинії. Найліпший має бути для нас кавкаський з Мінгрелії і Грузії, але в торгівлі его не дістане, так що за найліпший вважаєсь все ще кінський зуб Вірджинія. Угорський зуб росте скорше, але значно менший як американський або африканський.

3. Вчасна кукурудза. До вчасної причисляєсь сорокднівка (кварантен), пятьдесятднівка (чінквантіно) або серпнева, баденьська, грецка і бурґундска. Всі они середно високі і можуть у нас доходити в трохи теплійших місцях.

4. Карлова, дрібонька з яких нанероттольо (по італіяньски *panerottolo* значить „карличок“) єсть найвчаснійша і відай найдрібнійша.

Америка має багато своїх родів і там на дослідних фармах виплекали кукурудзи приноровлені до підсоня і почви.

В отсій статі звернемо увагу на відміну звану карличком або нанероттольо яку вважаємо за придатну до управи по цілій Галичині, навіть в холоднійших її сторонах. Ся кукурудза має багато прикмет, які управу її роблять дуже корисною.

Перша і рішаюча прикмета єсть дуже вчасне дозріванє. Підписаний садив сю кукурудзу в околиці Тернополя на поли отвертім і ніколи не мав

ні одного шулька недозрілого. Вся кукурудза була суха як перець з зерном твердим темно-жовтої аж майже червоної краски. Коли зважити, що околиця Тернополя лежить на північній Поділю в найзіймнійшій стороні Галичини, то можна бути певним, що нанероттольо дійде всюди в нашім краю. Мука з кукурудзи нанероттольо єсть добра на кулешу і смачна та гарної краски. Зерно єсть дрібне і надає ся до годівлі дробу, так що не треба єго перемелювати. Шумелина єсть добра на пашу, бо дрібна і м'ягка, так, що худоба з'їдає єї цілком, не полишаючи грубого бадилля як при високій кукурудзі. Не маловажною єсть також ся прикмета, що видаток з кукурудзи сеї мимо того, що зерно дрібне, єсть, бодай в околиці Тернополя, багато значнійший ніж з иншої, високої кукурудзи, але треба єї садити в відповідний спосіб, про що буде низше. Шульки, що правда, маленькі, але густо набиті зерном а качани дуже тоненькі, так що по стеребленю стілько майже буває зерна, як перед стеребленем шульків. Одною хибою сеї кукурудзи єсть то, що молода єсть лиш дуже короткий час добра до вареня і скоро твердне, але ся недогода єсть маловажна, бо загалом беручи, рільники наші не садять кукурудзи з цілію варити єї молоду а коли хто, особливо з інтелігенції, потребує більше смачної кукурудзи до кухні, то може держати инший відповідний рід як цукрову або ще ліпше велику, білу, столову або дрібну, білу, столову кукурудзу.

Пригадуючи ще раз всі вигоди з управи кукурудзи взагалі а добрі прикмети кукурудзи нанероттольо в спеціальности, можемо сьміло рід сей поручити до управи в цілім нашім краю, а що наш загал селянський єсть тяжкий на всякі новини, то Головна Рада „Сільського Господаря“ рішила сего року в ріжних сторонах краю перевести дослідні поля з управою сеї кукурудзи і має в намірі вислати до 20 Філій по 5 кг. насіння, щоби сї в своїх округах розділили по $1\frac{1}{2}$ кг. насіння між охочих

людей, які би схотіли спробувати її управи. Насіне нанероттоля єсть дрібне і з одного фунта засадить ся спорий кавалок.

З огляду, що насіне нової сеї кукурудзи буде ся висилати також в околиці, де загал не вмів коло кукурудзи ходити, подамо в слідуючім поученє, як її управляти.

На ґрунт не єсть кукурудза вибаглива, бо удаєсь на всяких почвах з виїмкою чисто піскових, сухих торфів і дуже цїпких, зсихаючих ся літом земель. На новинах, на добрих чорноземах удав ся дуже добре.

Всяка кукурудза, отже й наш карличок (nanerottolo) садить ся все на гною. Кукурудза належить до ростин, що не вилягають; під неї можна дати і найсильніших погноїв не боячи ся страт через виляганє. Можна для того уживати під містами компосту з людских відходів і землі, на якій інші збіжа звичайно вилягають.

Гній даєсь в осени і приоруєсь, бо розложені части гною можуть ростинок лекше спотребувати; але можна гній, вивезти ще вчасно на весну бо кукурудза не єсть дуже перебірлива і удасть ся і на пізнійше добре справленій почві, очевидно вже з слабшим видатком. З дуже добрим вислідом можна до кукурудзи додати штучних погноїв і так додаєсь на 1 морі около $1\frac{1}{2}$ сотнара салітри чілійскої, $1\frac{1}{2}$ сотнара суперфосфату і 2 сотнари каїніту.

Не менше важною від справи погноями єсть сама управа рілі, бо кукурудза любить землю пухку і чисту без хопти, для того треба під неї крім приораня гною орати ще два до три рази: раз під зиму а два рази на весну; раз вчасно а другий раз перед самим садженєм. Лекші ґрунти вдоволяють ся крім осінної одною оркою весняною. Крім ораня треба ще боронувати, валкувати і скрушувати землю в міру потреби і відповідно до почви.

На плодозмін не єсть кукурудза вразлива. Она належить до нечисленних ростин збіжевих, які

можна довго по собі рік по році управляти. Так пр. на покутскім Підгір'ю і в низших долинах гір коломийських садять кукурудзи безнастано на порічинах і она удає ся добре. Не виходить з того, щоби на кукурудзу уживати все того самого поля, бо і при ній добре уживати зміни. Місце відповідне для кукурудзи єсть по пшеници, ростилах окопових як бараболи або бураках, по горосі. Се все однак не єсть так важне; найважнійше, щоби земля була добре справлена і пухка а кукурудза удасть ся і ми звичайно кукурудзою зачинаємо сівооборот. По кукурудзі дуже добре сіяти ячмінь і то з конюшиною, бо ріля чіста.

Кукурудзу садить ся в половині мая до кінця мая, бо приморозки їй шкодять або нищать зовсім. Насіне добре перед садженем намочити на добу дві в розпущеній гноївці; але можна обійти ся і без накільчування, лиш порадно єсть намочити для знищення снітія в відповідній течі, найтанше в синім камені.

Садить ся кукурудзу рядами. Сіяти кукурудзу широкометно, як то у нас декуди роблять, єсть непрактично, бо кукурудза не посходить рівномірно, багато непокритого землею насіня пропадає непотрібно або западе за глибоко а ще до того пізнійша робота єсть дуже утяжлива і дорога. Ряди карличка дають ся на 50 цм. від себе, отже трохи близше як у високої кукурудзи. Можна би і густійше ряди давати, але тогди не можна би межі ряди пустити плужка або „плянету“ і відпала би користь з рядового садження, яке улекшує оброблене кукурудзи. В ряді карличок садить ся в той спосіб, що на кожних 40 цм. садить ся три зерна от так . . . побіч себе, значить ся в одній купці має рости побіч себе три рослини, коли при звичайній, високій кукурудзі лишає ся лише одну рослину. Зерна не насипуєсь тісно в одній ямці, бо коли трохи від себе віддалені, то можуть ліпше і свобіднійше розкорінити ся і красше ростуть. Карличок єсть дуже низонький так що на таким просторі, де росте

одна висока кукурудза, може свобідно розвивати ся три і они на добре справленій землі дадуть по два шульки а на лихшій по одному, так що видаток з нанеротгольо єсть богато більший ніж із звичайної кукурудзи. При полевій культурі в Тернопільщині видавав карличок по $1\frac{1}{2}$ кірця на такім самім просторі, на яким звичайна, висока кукурудза видавала по 1 кірцеві.

Садить ся зерно на 4—6 см. глибоко і то на землі легкій глибоше а на тяжкій, глинястій плитше. За глибоко посажені зерна сходять тяжше і пізнійше.

Дальша рѣбота при кукурудзі єсть часте обсапуванє і обкопуванє. Перший раз обсапує ся і зрушує ся землю, коли кукурудза вся посходить. Тогди то даєсь частина салітри, коли єї хто уживає для ліпшого росту. Другий раз обсапує ся, коли вже підростє і дає ся другу частину салітри та разом підгортає ся ростини землею. На тім звичайно кінчить ся робота, але ще ліпше було би обсапанє зробити ще третій раз, бо кукурудза дуже за се вдячна. Пізнати се по першім сапаню, коли то ростини, що доси майже не розвивались, нараз по сапаню підганяють ся мигом в гору. Що при сапаню і зрушуваню землі вичищуєсь хопту, то ледви чи треба додавати. Обриваня пагонів чи відростів, яке робить ся при другім мотиченю у великих родів кукурудзи, відпадає при карличку, бо сей не пускає бічних пагонів або дуже мало. Так само не практикує ся у карличка зрізуванє верхів по відцьвіті кукурудзи, бо такий низький, що нема що обрізувати. Зрушуванє землі, обгортанє і нищенє хопти робить ся межи рядами плужком або плянетом а в рядах треба допомочи сапою чи мотикою.

Звертаємо увагу, що вигляд карличка не обіцює богато жнива. Хто привик до високої кукурудзи а дивить ся на карличок, тому видаєсь він никлий і невидатний. Загал селян, що не видів карличка, уважає єго за недорід. Аж при обриваню

шульків показуєсь его видаток, а ще більше при лущеню. Шульки хоть малі, то набиті дрібним але твердим зерном.

Збирає ся кукурудзу обломлюючи шульки на поли. Можна також невеликі стебла карличка вивиривати з корінєм або відтинати і з шульками звести з поля до дому. Збір переводить ся, як вже шульки сухі, дозрілі, що буває у карличка дуже вчасно.

Межи рядами карличка можна би садити ще фасолю, або бураки, але тогди не можна уживати плужків при роботі. Серед рядів не можна насаджувати чогось, бо віддаль купок кукурудзяних на 40 цм. і так вже невелика.

Що з кукурудзиня єсть добра паша, яку за для м'яккости била худоба всю з'їдає, вже згадували-сьмо.
