

1243.

МИКОЛА ГЕНРИХ АБЕЛЬ

І ЕГО ЗНАЧІНЄ В МАТЕМАТИЦІ.

(З НАГОДИ СТОЛІТНИХ РОКОВИН ЕГО УРОДИН).

Написав

Клим Глїбовицкій.

Відбитка з „Збірника секції математично-природописно-лікарської Наукового Товариства ім. Шевченка“ том IX.

У ЛЬВОВІ, 1903.

Накладом Товариства.

З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка
під зарядом К. Беднарського.

2007
2012

МИКОЛА ГЕНРИХ АБЕЛЬ

І ЕГО ЗНАЧІНЄ В МАТЕМАТИЦІ.

(З НАГОДИ СТОЛІТНИХ РОКОВИН ЕГО УРОДИН).

Написав

Клим Глібовицкій.

Відбитка з „Збірника секції математично-природописно-лікарської Наукового Товариства і.м. Шевченка“ том IX.



У ЛЬВОВІ, 1903.

Накладом Товариства.

З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка
під зарядом К. Беднарського.

51(092)

125

ЛЬВІВСЬКА БІБЛІОТЕКА
АН УРСР
№ И 39599

МИКОЛА ГЕНРИХ АБЕЛЬ І ЄГО ЗНАЧЕННЯ В МАТЕМАТИЦІ.

(З нагоди столітних роковин єго уродин).

НАПИСАВ

Клим Глібовицький.

Світ науковий обходив 1902. р. столітню річницю уродин великого генія, математика норвегського Абеля. В виданнях товариств наукових усіх народів виїшли або ще вийдуть статі посвячені пам'яті сего незвичайного чоловіка — велита, яких не числить на сотки історія культури людскости¹⁾. Може раз на сто років спроможесь природа на єство такої сили духа, яка була у Абеля; творчість єго така величезна, а діла такої ваги в історії розвою математики, що прямо непонятним здає ся, щоби се міг зробити чоловік, що в 27. році життя зійшов до гробу. — Не годить ся-ж і нам остати зовсім по заду других і не почитити Абелевого ювілею; а не мож сего зробити краще, як передаючи спадщину по нїм виданням Наукового Товариства ім. Шевченка.

ЧАСТЬ ПЕРША.

Житє Абеля.

Микола Генрих Абель (Niels Henrik Abel) родив ся 25. серпня 1802. р. в селі Findoe в Норвегії, де батько єго був протестанцким

¹⁾ Єго пам'яті посвячений приміром величавий твір: N. H. Abel, memorial publié à l'occasion du centenaire de sa naissance. (Leipzig, B. G. Teubner 1902, ціна 21 марок).

пастором. Дитячі літа перевів Абель в Gierrestadt, сусідній парохії, де вже в р. 1803. перенісся його отець. І ту розпочалося образоване малого хлопця під проводом самого батька і тривало до р. 1815, поки він не вступив до школи катедральної в Християнії. Ту зразу не ввіжнявся він від своїх співучеників; аж коли в р. 1818. Holmbое зістав іменованим професором в тій власне школі, тоді на окремих годинах, які сей професор призначив на вправлюване своїх учеників в розвязуваню проблемів з алыебри і геометрії, показавсь вперше талан Абеля, і від тоді став він розвиватись безпримірно



1802 — 1829.

скоро. Уже тодашні його поступки казали догадуватись в нїм генія. Проф. Holmbое зайняв ся ним і поза годинами шкільними перейшов з ним основи рахунку ріжничкового і інтегрального Айлера (Euler). Відтак Абель ішов вже дальше самостійно, читав праці Lacroix'a, Francoeur'a, Poisson'a, Gauss'a, Lagrange'a і сам став пробувати сил своїх. Скінчивши школу катедральну вже по смерти свого батька вступив він на університет в Християнії, а що батько не оставив средств на його образоване, то деякі з поміж професорів зложивлись, щоби дати Абелеви можливість незалежного іstownая,

конечного для так визначного талану. По двох роках ряд на внесенє сенату академічного надав єму надзвичайну стипендію в висоті 200 Sp. річно. І ту стипендію побирав він через два роки аж до правильного укінчення студій університетских.

В тім часі працював Абель з великим запалом і напсав кілька розправ друкованих в „Magazin für die Naturwissenschaften“ в Християнії. Перша з них друкована в р. 1820. має заголовок: „Allgemeine Methode Functionen einer variablen Grösse zu finden, wenn eine Eigenschaft dieser Functionen durch eine Gleichung zwischen zwei Variablen ausgedrückt ist“. І вже тоді займав ся він справою розвязки альгебраїчної рівняня пятого степеня; раз навіть здавалось єму вже, що найшов розвязку, та на жаль спостеріг похибку в своїй роботі. Але се єго не зразило, і він постановив собі або дійти до розвязки або показати, що розвязка є неможлива. Се послідне вдалось єму і він в р. 1824. оголосив в Християнії свій доказ під заголовком: „Mémorie sur les équations algébriques où on démontre l'impossibilité de la résolution de l'équation générale du cinquième degré“. Так розяснив Абель се питанє в теорії рівнянь альгебраїчних, питанє найважнійше, яке було до розвязаня в аналізі, як каже Legendre¹⁾.

З огляду на ту визначну діяльність наукову надав ряд Абељеви на єго просьбу стипендію 600 Sp. річно на протяг двох років, щоби єму уможливити дальше фахове образованє на заграничних університетах. Абель хотів зразу їхати прямо до Парижа, але що разом їхали і другі єго крайни і вибирали Берлін, то і він поїхав разом і не жалував сего, бо там познакомив ся з Crelle'ом, що став відтак єго щирим приятелем і був ним аж до смерти. Дневник „Crelle's Journal“, якого перший зошит вийшов з початком р. 1826. в часі побуту Абеља в Берлінї, причинив ся немало до лїтерацкої слави Абеља. Він був одним з найдіяльнійших співробітників сеї часописи і в кождім зошиті була бодай одна або дві єго розвідки; а кожда з них причинила ся немало до піднесеня поваги сеї часописи.

З кінцем лютого р. 1826. покинув Абель Берлін і на Липск, Фрейбург, Дрезно і Прагу поїхав до Відня; по місяцю, десь з кінцем мая, виїхав він з Відня до Італії та Швайцарії, а в липни був вже в Парижи, де задержав ся на довше, бо до січня 1827. р. Ту

¹⁾ Обширне представленє сеї kwestії находить ся в розвідці: „К. Глібовицкий. Рівнянє пятого степеня (Збірник матем. природ. том II).

познакомив ся він з многими математиками, а між ними і з Cauchy'ом. Відтак побув еще в Берліні та Копенгазі, а в маю був вже з поворотом в Християнії. Ту старав ся він о катедру математики на університеті, але обі катедри, які були, були на сей час заняті, а нової для Абеля ряд не хотів утворити. І так оставав він без місця аж до р. 1828, коли то поручено єму заступство проф. Hansteen'a на час подорожи сего до Сибєрії. Вже тоді був Абель членом королівської академії наук в Thronthjem.

Приятелі Абеля в Німеччині звернули увагу пруского міністра просьвіти на визначний талан Абеля і спонукали, що ряд згодив ся запросити єго на берлінський університет. В тім самім часі кількох членів королівської академії наук в Парижі звернули ся до короля шведского з просьбою, щоби покликав Абеля на університет в Штокгольмі, та пруский ряд посилав ся. Crelle дістав припоручене поспитати Абеля, чи евентуально прийняв би запрошенє, а по прихильній єго відповіді мав остаточно уложити ту справу і стягнути Абеля до Берліна. Єще того самого дня сповнив Crelle припорученє, та на жаль було за пізно — лист прийшов вже по смерти. Невпинна праця послїдних років, а також журба о завтра підкосили і так не сильне здоровлє Абеля. В грудни 1828. р. серед лютої зими виїхав він до гуті желізної в Froland коло Arendal, де була єго наречена панна Кетр (пізнійше пані Keilhau); там захорував в сїчни 1829. р. і мимо усяких старань і заходів нареченої і властителїв гуті помер на чахотку дня 6. цьвітня 1829¹⁾.

Можна сміло сказати про него: Коли-б був пожив довше, то не одно еще були-б про него почувли. То, що Абель оставив по собі, дає повне право до такого висказу. Вистанє згадати доказ про неможливість альгебраїчної розвязки рівнань загальних степеня вишого чим четвертий, єго праці над функціями еліптичними, які властиво він сотворив разом з Jacobі'm, розправу про загальні прикмети функцій переступних і т. д., щоби бачити, що не сказалося за богато. Се все є праці, що далеко розширили границі аналізи.

Пригляньмо ся тепер спадщині, яка осталає по сїм так передчасно померлим геніяльним математичним дусі.

¹⁾ Порів. Holmboe: Noties sur la vie de l'auteur (Передмова до Oeuvres complètes de N. H. Abel). Обширну біографію Абеля видав Bjerknєs п. зар. Niels-Henrik Abel (Paris, Gauthier-Villars 1885).

ЧАСТЬ ДРУГА.

Твори Абеля¹⁾.

І. Шуканє функцій двох величин змінних незалежних x і y , таких $f(xy)$, що $f(z, f(xy))$ є функцією симетричною величини x , y і z . (Oeuvres complètes I. 1).

Вийшовши з частного приміру:

$$f(xy) = x+y, \quad \text{де} \quad f(z, f(xy)) = z+x+y,$$

де отже виходить симетрична функція даних величин, шукає автор відтак загальної форми функції f . Яко симетрична мусить она сповняти слідуєчі рівняня:

$$f(z, f(xy)) = f(x, f(yz))$$

$$f(z, f(xy)) = f(y, f(zx))$$

а коли для скорочення назвем:

$$f(xy) = r, \quad f(yz) = v, \quad f(zx) = s \quad (1),$$

то дістанемо через різничкованє:

$$\frac{\partial r}{\partial x} \cdot \frac{\frac{\partial v}{\partial y}}{\frac{\partial v}{\partial z}} = \frac{\partial r}{\partial y} \cdot \frac{\frac{\partial s}{\partial x}}{\frac{\partial s}{\partial z}}.$$

Наколи приймем z постійне, тоді:

$$\frac{\partial v}{\partial y} : \frac{\partial v}{\partial z} = \varphi(y)$$

¹⁾ Твори Абеля вийшли в двох виданнях; перше виданє видав Holmboe в р. 1839, друге, дуже старанно зредатованє через L. Sylow'a і S. Lie, вийшло заходом ряду норвегского в Християнії в мові французкій в р. 1881. п. заг.: Oeuvres complètes de Niels-Henrik Abel, nouvelle édition (перший том ст. VIII+621, том другий ст. IV+341) ціна 24 марок. — Розвідки Абеля, що ся відносять до алгебраїчної розвязки рівнянь, видав H. Maser враз з творами E. Galois під заг. Abhandlungen über die algebraische Auflösung der Gleichungen (Berlin, J. Springer 1889); їх є пять. Дві розвідки Абеля вийшли в „Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften“, а іменно № 71 клясиків (з р. 1895) містить: „Untersuchungen über die Reihe $1 + \frac{m}{1}x + \frac{m(m-1)}{1.2}x^2 + \dots$ “, а № 111 (з р. 1900) містить: „Abhandlung über eine besondere Klasse algebraisch auflösbarer Gleichungen“. Одна розвідка п. з. „mémoire sur une propriété générale d'une classe très-étendue de fonctions transcendentes“ вийшла в Парижі в р. 1841.

буде функцією самого y , а

$$\frac{\partial s}{\partial x} : \frac{\partial s}{\partial z} = \varphi(x)$$

буде такою самою функцією величин z і x , як v величин z і y ; а z відси:

$$r = \psi \left[\int \varphi(x) dx + \int \varphi(y) dy \right]$$

(ψ якась функція). А коли для скорочення поставимо за інтеграл

$$\int \varphi(x) dx \text{ і } \int \varphi(y) dy \text{ } \varphi(x) \text{ та } \varphi(y), \text{ дістанемо:}$$

$$r = f(xy) = \psi(\varphi(x), \varphi(y)) \quad (2)$$

т. є. форму, яку має мати функція дана, лиш треба обмежити рівняння головні (1), бо форма (2) є більше загальна як (1).

В той сам спосіб буде далі:

$$f(z, r) = \psi(\varphi(z), \varphi(r)) = \psi(\varphi(z) + \varphi(\varphi(z), \varphi(y))).$$

А що се виражене є симетричне з огляду на x, y, z , то:

$$\varphi z + \varphi \psi(\varphi x + \varphi y) = \varphi x + \varphi \psi(\varphi y + \varphi z).$$

Най: $\varphi z = 0, \varphi y = 0$, то:

$$\varphi \psi(\varphi x) = \varphi x + c.$$

Положім $\varphi(x) = p$, то:

$$\varphi \psi(p) = p + c,$$

а коли φ_1 є функцією відвратною до φ такою, що $\varphi \varphi_1(x) = x$, то:

$$\psi(p) = \varphi_1(p + c),$$

а форма загальна функції, яку шукаєм, буде:

$$f(xy) = \varphi_1(c + \varphi x + \varphi y). \quad (3)$$

Автор кінчить натяком, що можна в подібній спосіб найти функції двох величин змінних, що будуть сповняти рівняня дані трох змінних.

Близькою тій розвідці є вinya про: функції, що сповняють рівняне $\varphi x + \varphi y = \psi(x\varphi y + y\varphi x)$. (Oeuvres compl. I. 103).

Рівняне:

$$\varphi x + \varphi y = \psi(x\varphi y + y\varphi x) \quad (1)$$

буде сповнене, коли приміром:

$$\varphi y = \frac{1}{2}y, \text{ а } \varphi x = \psi x = \log x$$

або коли :

$$f_x = \sqrt{1-y^2}, \quad \text{а} \quad \varphi_x = \psi_x = \arcsin x.$$

Абель ставить собі за задачу найти загальний вид функцій, що відповідали би даному рівнянню і вводить, що функціями такими будуть :

$$\varphi_x = a\alpha \int \frac{dx}{f_x + \alpha'x}$$

$$\text{де } a = \varphi'0, \quad \alpha = f0, \quad \alpha' = f'0 \quad (2)$$

$$\psi_x = a\alpha \int \frac{dx}{\alpha f\left(\frac{x}{\alpha}\right) + \alpha'x} + \varphi0$$

підчас коли само f_x є визначене через рівняне :

$$f'x (f_x + \alpha'x) + (mx - \alpha'f_x) = 0 \quad (3)$$

або :

$$c^{2n} = (f_x - nx)^{n+\alpha} (f_x + nx)^{n-\alpha'}$$

де c означає постійну інтегрованя.

Рівняня ті можуть послужити до вишуканя функцій сповнюючих рівняне (1), в частных случаях, при означеннх вартостях на n і α' .

Функцію φ_x виражену ту (2) в виді інтегралу мож також представити при помочи логаритмів в виді :

$$\varphi_x = \frac{a\alpha}{n+\alpha'} \log (cpx + cf_x), \quad f_x \text{ відоме.}$$

В случаях $\alpha' = \infty$, і $n = 0$, f_x приймає якусь вартість частну яку найде ся з рівняня (3).

II. Квествю розвязки рівнянь альгебраїчних розібрав і розвязав Абель в слідующих розвідках :

а) Розвідка про рівняня альгебраїчні, де виказуєсь неможливість розвязки загального рівняня пятого степеня. (Христьянія 1824, Oeuvres compl. 1881. I. 28).

б) Доказ неможливости альгебраїчної розвязки загальних рівнянь, степеня висшого як четвертий. (Crelle's Journal I. 1826. Oeuvres compl. I. 66).

в) Розвідка про спеціальну клясу рівнянь, що ся дають альгебраїчно розвязати. (Crelle's J. IV. 1829. Oeuvres compl. I. 478).

г) Про альгебраїчну розвязку рівнянь (твір посмертний, Oeuvres compl. II. 217).

д) Нова теория альгебраїчної розвязки рівнянь (вступ до розвідки попередної, Oeuvres compl. II. 329).

Висліди тих епохальних розвідок, що творять chef d'oeuvres Абеля в альгебрі, розібрали ми основно в наведеній висше розвідці¹⁾, тому пригадаєм тут лиш хід гадок в головних чертах.

1. Абель каже ось-так: Розв'язати альгебраїчно рівняне значить виразити коренї рівняня через функції альгебраїчні сочинників. Тому-то розбирає він вперед загальний вид функцій альгебраїчних і шукає, чи можна сповнити дане рівняне, наколи вставимо на місце незвісної виражене функції альгебраїчної.

Най:

$$c_0 + c_1 y + c_2 y^2 + \dots + c_{r-1} y^{r-1} + y^r = 0 \quad (1)$$

буде дане рівняне з сочинниками c_0, c_1, c_2, \dots , що є вимірними функціями величин независимих x', x'', \dots , та най функція альгебраїчна величин x', x'', \dots :

$$y = q_0 + q_1 p^{\frac{1}{n}} + q_2 p^{\frac{2}{n}} + \dots + q_{n-1} p^{\frac{n-1}{n}} \quad (2)$$

сповняє то рівняне. Вставивши то виражене за y в дане рівняне одержимо (редукуючи висші степені p , чим $p^{\frac{n-1}{n}}$) виражене виду:

$$r_0 + r_1 p^{\frac{1}{n}} + r_2 p^{\frac{2}{n}} + \dots + r_{n-1} p^{\frac{n-1}{n}} = 0 \quad (3)$$

де r_0, r_1, \dots, r_{n-1} є функції вимірні величин $p, q_0, q_1, \dots, q_{n-1}$. Рівняне (3) сповнить ся лиш тоді, наколи:

$$r_0 = 0, r_1 = 0, \dots, r_{n-1} = 0.$$

Оно ся сповнить також, коли за $p^{\frac{1}{n}}$ будемо класти по черзі:

$$\alpha^s p^{\frac{1}{n}} \quad (s = 0, 1, 2, \dots, n-1),$$

де α є коренї рівняня:

$$\alpha^{n-1} + \alpha^{n-2} + \dots + 1 = 0.$$

З огляду на се дістанемо на y ряд вартостей (q_1 кладем = 1).

$$y_1 = q_0 + p^{\frac{1}{n}} + q_2 p^{\frac{2}{n}} + \dots + q_{n-1} p^{\frac{n-1}{n}}$$

$$y_2 = q_0 + \alpha p^{\frac{1}{n}} + q_2 \alpha^2 p^{\frac{2}{n}} + \dots + q_{n-1} \alpha^{n-1} p^{\frac{n-1}{n}}$$

Звідси можна кожду з величин:

$$p^{\frac{1}{n}}, q_0, q_2, \dots, q_{n-1}$$

¹⁾ пор. Глібовицкий loc. cit.

виразити вимірюмо через u_1, u_2, \dots . Бачимо проте, що наколи рівнянє якесь дасть ся альгебраїчно розв'язати, то на кождий корінь рівнянєа дістанемо вираженє таке, що кожда функція, яка в нього входить, є вимірюмою функцією корінів даного рівнянєа (1).

Наколи загальнє рівнянє пятого степєня має мати розв'язку альгебраїчну, то в склад єго увійдуть функції виду $v = R^{\frac{1}{m}}$, де R є вимірюма функція сочинників рівнянєа, а m є число перве. На основі (1) є v вимірюма функція корінів; она має m ріжних вартостей, а так як число ріжних вартостей, які функція m величин може приймати, не може бути меньше, як найбільше число перве, що приходить в добутку $1.2.3. \dots m$, бо в противнім разі зведе ся до 2 або 1, а се є функція пятох величин x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , то m яко число перве може бути рівнє 1, 2, 5. $m = 1$ треба відкинути, бо корінь рівнянєа не може бути вимірюмою функцією сочинників; остає отже $m = 2, 5$.

Возьмім $m = 5$; загальний вид функції п'ятивартістної пятох величин є:

$$\sqrt[5]{R} = r_0 + r_1 x + r_2 x^2 + r_3 x^3 + r_4 x^4;$$

з відси:

$$x = s_0 + s_1 R^{\frac{1}{5}} + s_2 R^{\frac{2}{5}} + s_3 R^{\frac{3}{5}} + s_4 R^{\frac{4}{5}},$$

а відтак, як передше:

$$s_1 R^{\frac{1}{5}} = \frac{1}{5} (x_1 + \alpha^4 x_2 + \alpha^3 x_3 + \alpha^2 x_4 + \alpha x_5) \quad (\alpha^5 = 1).$$

То рівнянє є неможливє, позаяк права сторона має 120 вартостей, коли тимчасом се має бути корінь рівнянєа 5. степєня:

$$z^5 - s_1 R = 0.$$

Остає отже $m = 2$. Тоді є:

$$\sqrt{R} = p + qs,$$

де p і q є функції симетричні, а $s = (x_1 - x_2) \dots (x_4 - x_5)$; а що, наколи перемінимо x_1 і x_2 випадє:

$$-\sqrt{R} = p - qs,$$

то мусить бути $p = 0$, отже $\sqrt{R} = qs$, значить ся, що кожда альгебраїчна функція першого степєня, що виступає в вираженю на корінь, мусить мати вид $\alpha + \beta \sqrt{s^2} = \alpha + \beta s$ (α, β симетричні функції). А що є річ неможлива, коріні виразити через функцію виду $\alpha + \beta \sqrt{R}$, то мусить ієтнувати рівнянє:

$R^m = \sqrt[m]{\alpha + \beta \sqrt{s^2}} = v$ (α, β функції симетричні, m число перве, v виміряма функція корінів). Звідси є:

$$v_1 = \sqrt[m]{\alpha + \beta s}, \quad v_2 = \sqrt[m]{\alpha - \beta s}, \quad v_1 v_2 = \sqrt[m]{\alpha^2 - \beta^2 s^2}.$$

Наколи би функція $v_1 v_2$ не була симетрична, то для $m = 2$ було би $v = \sqrt{\alpha + \beta \sqrt{s^2}}$, значить ся v мали би чотири вартости, що неможливе. Мусить отже $\gamma = \sqrt{\alpha^2 - \beta^2 s^2}$ бути функція симетрична; тоді є:

$$p = v_1 + v_2 = R^{\frac{1}{m}} + \frac{\gamma}{R} R^{\frac{m-1}{m}}, \quad R = \alpha + \beta \sqrt{s^2}.$$

Положим за $R^{\frac{1}{m}}, \alpha R^{\frac{1}{m}}, \alpha^2 R^{\frac{2}{m}}, \dots$ де $\alpha^{m-1} + \alpha^{m-2} + \dots + 1 = 0$, то дістанем місто p вартости p_1, p_2, \dots, p_m . Легко показати, що p має m різних вартостей; звідси слідує $m = 5$, а тоді:

$$p = R^{\frac{1}{5}} + \frac{\gamma}{R} = r_0 + r_1 x + r_2 x^2 + r_3 x^3 + r_4 x^4.$$

Звідси слідує далі:

$$x = s_0 + s_1 p + s_2 p^2 + s_3 p^3 + s_4 p^4,$$

або:

$$x = t_0 + t_1 R^{\frac{1}{5}} + t_2 R^{\frac{2}{5}} + t_3 R^{\frac{3}{5}} + t_4 R^{\frac{4}{5}}$$

(t_0, t_1, \dots є вимірими функції R і сочинників даного рівняня. Звідси (як передше):

$$t_1 R^{\frac{1}{5}} = \frac{1}{5} (x_1 + \alpha^4 x_2 + \alpha^3 x_3 + \alpha^2 x_4 + \alpha x_5) = p' \quad (4)$$

далі є:

$$p'^5 = t_1^5 R,$$

а що

$t_1^5 R$ має вид $u + u' \sqrt{s^2}$, то є $p'^5 = u + u' \sqrt{s^2}$, або $(p'^5 - u)^2 = u'^2 s^2$.

Звідси би виходило p' через рівняне 10. степеня, якого сочинники є симетричними функціями, а що се неможливе, бо після (4) p' мало би 120 різних вартостей, то і загальне рівняне степеня пятого (а так само і вишого) не дасть ся розвязати.

2. Та хотяй рівняня степеня вишого чим 4. взагалі альгебраічно розвязати ся не дадуть, то однак є певна кляса рівнянь всяких степенів, що дають розвязку альгебраічну; такими є приміром рівняня виду $x^n - 1 = 0$. Розвязка таких рівнянь опираєсь

на відношеннях, які заходять між коріннями. І так: коли два корінні рівняння незведимого є так зв'язані між собою, що один з них можна виразити вимірно через другий, тоді розв'язка рівняння даного дає ся звести до розв'язки якогось числа рівнянь низшого степеня. А і само рівнянє данє дасть ся тоді розв'язати альгебраїчно, коли степенє вго є числом первим.

Так само дасть ся розв'язати рівнянє, всли всі вго корінї можє представити в видї:

$$x, \theta x, \theta^2 x, \dots, \theta^{n-1} x \quad (\theta^n x = x)$$

(є се Абелева група правильна), де θx є вимірима функція величини x , $\theta^2 x$ така сама функція, що θx , два рази взята ($\theta^2 x = \theta(\theta x)$) і т. д.

Метода, якою послугує ся Абель при розв'язуваню сих послїдних рівнянь, годить ся з методою Gauss'a, поданою в „Disquisitiones arithmeticae“ pag. 645 sqts.

В сїм случаю всі корінї рівняннє дадуть ся виразити вимірно при помочи одного з них; але на відворот рівняннє, котрих корінї мають ту прикмету, не все дають ся розв'язати альгебраїчно, кромє що-йно наведеного случаю.¹⁾

Розв'язка альгебраїчна рівняннє є можлива єще в однім случаю, а се тоді, коли всі корінї рівняннє дадуть ся виразити альгебраїчно через один з них, приміром z , а поміж двома якими-небудь коріннями тогож рівняннє θx і $\theta_1 x$ заходить відношенє:

$$\theta \theta_1 x = \theta_1 \theta x.$$

(є се група абелева).

На случай, коли степенє рівняннє даного $\varphi(x) = 0$ (а все маємо на думці рівняннє незведимі) μ дасть ся розложити ся на:

$$\mu = \varepsilon_1^{\nu_1} \varepsilon_2^{\nu_2} \varepsilon_3^{\nu_3} \dots \varepsilon_\alpha^{\nu_\alpha}$$

де $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 \dots$ є числами первими, тоді x буде можна винайти через розв'язку ν_1 рівнянь степеня ε_1 , ν_2 рівнянь степеня ε_2 і т. д. і всі ті рівняннє дадуть ся альгебраїчно розв'язати.

Коли $\mu = 2^{\nu}$, можна найти вартість x через витягненє ν корінїв квадратових.

Ті вислїди стосує Абель до функцій колових і показує, що щоби подїлити округ кола на $(2n + 1)$ рівних частий, вистанє:

¹⁾ Рівняннє ті назвав Kronecker „рівняннями Абелевими“.

- 1) поділити округ на $2n$ рівних частин.
- 2) поділити лук на $2n$ рівних частин.
- 3) витягнути корінь квадратний з величини $(2n + 1)$.

Послідний теорем висказав вже і Gauss в *Diquisitiones arith.*, на що і Абель ся покликую.

3. Дальші яго праці з обсягу **альгебри** відносились до сумованя рядів. Тут належать :

Досліди над рядом :

$$1 + \frac{m}{1} x + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^3 + \dots$$

(Oeuvres compl. I. 66)

Розвідка ся важна є тим, що в ній по раз перший (спрецизовано) поставлено умовини збіжності ряду.

Тих умовин і прикмет рядів збіжних вичислює автор 6, а є они слідуючі :

I. Єсли q_0, q_1, q_2, \dots становлять ряд величин додатних, а квот $\frac{q_{m+1}}{q_m}$, для ростучих безнастанно вартостей m , зближає ся безконечно до границі a , де $a > 1$, тоді ряд :

$$\varepsilon_0 q_0 + \varepsilon_1 q_1 + \varepsilon_2 q_2 + \dots + \varepsilon_m q_m + \dots$$

— де ε_m для m безнастанно ростучого не наближає ся безконечно до зєра, — є рядом розбіжним.

II. Наколи в ряді $q_0 + q_1 + q_2 + \dots$ квот $\frac{q_{m+1}}{q_m}$

для ростучих вартостей m зближає ся безнастанно до границі $a < 1$, тоді ряд

$$\varepsilon_0 q_0 + \varepsilon_1 q_1 + \varepsilon_2 q_2 + \dots$$

— де $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ не переходять одиниці, — є рядом збіжним.

III. Єсли $p_m = t_0 + t_1 + t_2 + \dots + t_m$

є меньше, чим якась означена величина δ , тоді

$$r = \varepsilon_0 t_0 + \varepsilon_1 t_1 + \varepsilon_2 t_2 + \dots + \varepsilon_m t_m$$

є меньше, чим $\varepsilon_0 \delta$, де $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ суть величинами додатними маліючими.

IV. Наколи ряд

$$f(\alpha) = v_0 + v_1 \alpha + v_2 \alpha^2 + \dots + v_m \alpha^m + \dots$$

є збіжний для якоїсь вартости δ змінчивої α , то він буде збіжний і для кождої меньшої вартости α , а для безнастанно маліючої вартости β функция $f(\alpha + \beta)$ зближає ся безконечно до границі $f(\alpha)$, коли α є рівне або меньше чим δ .

V. Коли $v_0 + v_1 \delta + v_2 \delta^2 + \dots$

є рядом збіжним, а v_0, v_1, v_2, \dots представляють функції величини x , тяглі в границях межі a і b , то ряд

$$f x = v_0 + v_1 \alpha + v_2 \alpha^2 + \dots,$$

де $\alpha < \delta$, буде також збіжний і буде функцією тяглою x в тих самих границях.

VI. Если через $\varrho_0, \varrho_1, \varrho_2, \dots$, $\varrho'_0, \varrho'_1, \varrho'_2, \dots$

назначимо вартости чисельні відповідних членів двох рядів збіжних

$$v_0 + v_1 + v_2 + \dots = p, \quad v'_0 + v'_1 + v'_2 + \dots = p'$$

то наколи ряди

$$\varrho_0 + \varrho_1 + \varrho_2 + \dots, \quad \varrho'_0 + \varrho'_1 + \varrho'_2 + \dots$$

суть збіжні, тоді ряд $r_0 + r_1 + r_2 + \dots$ котрого член загальний є :

$$r_m = v_0 v'_m + v_1 v'_{m-1} + v_2 v'_{m-2} + \dots + v_m v'_0$$

буде новим рядом збіжним, а его сума буде рівнатись :

$$(v_0 + v_1 + v_2 + \dots) (v'_0 + v'_1 + v'_2 + \dots).$$

По тім вступі автор приходить до властивої задачі вишуканя суми ряду :

$$1 + \frac{m}{1} x + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^3 + \dots \quad (1)$$

для всіх вартостей дійсних або мнимих x і m , для яких сей ряд є збіжний.

Назвім наш ряд через $\varphi(m)$ і положім для скороченя :

$$1 = m_0, \quad \frac{m}{1} = m_1, \quad \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} = m_2, \quad \dots, \quad \frac{m(m-1)\dots(m-\mu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \mu} = m_\mu$$

$$\text{то } \varphi(m) = m_0 + m_1 x + m_2 x^2 + \dots + m_\mu x^\mu + \dots \quad (2)$$

$$\text{Най } x = a + bi, \quad m = k + k'i \quad (i = \sqrt{-1})$$

де a, b, k, k' є числа дійсні, то дістанемо

$$\varphi(m) = p + qi$$

де p і q суть рядами.

Представмо x в виді

$$x = a (\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad \text{де } a = \sqrt{a^2 + b^2}$$

так само :

$$\frac{m - \mu + 1}{\mu} = \delta_\mu (\cos \gamma_\mu + i \sin \gamma_\mu)$$

де

$$\delta_{\mu} = \sqrt{\left(\frac{k-\mu+1}{\mu}\right)^2 + \left(\frac{k'}{\mu}\right)^2}$$

то :

$$m_{\mu} x^{\mu} = \alpha^{\mu} \cdot \delta_1 \cdot \delta_2 \cdot \delta_3 \cdots \delta_{\mu} [\cos(\mu\varphi + \gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_{\mu}) + i \sin(\mu\varphi + \gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_{\mu})].$$

Для скорочення назовемо :

$$\delta_1 \cdot \delta_2 \cdot \delta_3 \cdots \delta_{\mu} = \lambda_{\mu}$$

$$\mu\varphi + \gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_{\mu} = \Theta_{\mu}$$

тоді :

$$m_{\mu} x^{\mu} = \lambda_{\mu} \alpha^{\mu} (\cos \Theta_{\mu} + i \sin \Theta_{\mu})$$

а $\varphi(m)$ представить ся :

(3)

$$\varphi(m) = 1 + \lambda_1 \alpha (\cos \Theta_1 + i \sin \Theta_1) + \lambda_2 \alpha^2 (\cos \Theta_2 + i \sin \Theta_2) + \cdots + \lambda_{\mu} \alpha^{\mu} (\cos \Theta_{\mu} + i \sin \Theta_{\mu}) + \cdots$$

з відси :

$$p = 1 + \lambda_1 \alpha \cos \Theta_1 + \lambda_2 \alpha^2 \cos \Theta_2 + \cdots + \lambda_{\mu} \alpha^{\mu} \cos \Theta_{\mu} + \cdots \quad (4)$$

$$q = \lambda_1 \alpha \sin \Theta_1 + \lambda_2 \alpha^2 \sin \Theta_2 + \cdots + \lambda_{\mu} \alpha^{\mu} \sin \Theta_{\mu} + \cdots$$

З форми на λ_{μ} виходить

$$\lambda_{\mu+1} = \delta_{\mu+1} \lambda_{\mu}$$

отже :

$$\lambda_{\mu+1} \alpha^{\mu+1} = \alpha \delta_{\mu+1} \lambda_{\mu} \alpha^{\mu}$$

або :

$$\frac{\lambda_{\mu+1} \alpha^{\mu+1}}{\lambda_{\mu} \alpha^{\mu}} = \alpha \delta_{\mu+1}$$

а що :

$$\delta_{\mu+1} = \sqrt{\left(\frac{k-\mu}{\mu+1}\right)^2 + \left(\frac{k'}{\mu}\right)^2}$$

для вартостей μ рстучих в безконечність зближає ся до одиниці, через що

$$\frac{\lambda_{\mu+1} \alpha^{\mu+1}}{\lambda_{\mu} \alpha^{\mu}}$$

наближає ся до границі α , проте p і q буде збіжне або розбіжне, залежно від того, чи α в більше, чи меньше від одиниці.

Представмо ряд $\varphi(m)$ в видї:

$$p + qi = r(\cos s + i \sin s)$$

де $r = \sqrt{p^2 + q^2};$

возьмім, що:

$$s = \psi(k, k'), \quad r = f(k, k'),$$

то:

$$p + qi = \varphi(k + k'i) = f(k, k') [\cos \psi(k, k') + i \sin \psi(k, k')]$$

а вид тих функцій f і ψ буде:

одної:

$$\psi(k, k') = \beta k + \beta' k' - 2m\pi$$

де β і β' суть якимись величинами постійними,

а другої:

$$f(k, k') = e^{\delta k + \delta' k'}$$

де δ і δ' суть рівнож величинами постійними.

З віден:

$$\varphi(k + k'i) = e^{\delta k + \delta' k'} [\cos(\beta k + \beta' k') + i \sin(\beta k + \beta' k')] \quad (5)$$

є найзагальнішою функцією, представляючою суму ряду $\varphi(m)$ з неозначеними еще на разї величинами постійними $\beta, \beta', \delta, \delta'$.

Розділім часть першорядну і другорядну, то дістанемо:

$$e^{\delta k + \delta' k'} \cos(\beta k + \beta' k') = 1 + \lambda_1 \alpha \cos \Theta_1 + \lambda_2 \alpha^2 \cos \Theta_2 + \dots + \lambda_\mu \alpha^\mu \cos \Theta_\mu + \dots \quad (6)$$

$$e^{\delta k + \delta' k'} \sin(\beta k + \beta' k') = \lambda_1 \alpha \sin \Theta_1 + \lambda_2 \alpha^2 \sin \Theta_2 + \dots + \lambda_\mu \alpha^\mu \sin \Theta_\mu + \dots$$

а для $k' = 0$ взори ті перейдуть на:

$$e^{\delta k} \cos \beta k = 1 + \frac{k}{1} \alpha \cos \varphi + \frac{k(k-1)}{1.2} \alpha^2 \cos 2\varphi + \frac{k(k-1)(k-2)}{1.2.3} \alpha^3 \cos 3\varphi + \dots \quad (7)$$

$$e^{\delta k} \sin \beta k = \frac{k}{1} \alpha \sin \varphi + \frac{k(k-1)}{1.2} \alpha^2 \sin 2\varphi + \frac{k(k-1)(k-2)}{1.2.3} \alpha^3 \sin 3\varphi + \dots$$

а з віден для $k = 1$ найдемо:

$$e^\delta = \sqrt{1 + 2\alpha \cos \varphi + \alpha^2} \quad \text{і} \quad \text{tg} \beta = \frac{\alpha \sin \varphi}{1 + \alpha \cos \varphi}$$

т. з.

$$\delta = \frac{1}{2} \log(1 + 2\alpha \cos \varphi + \alpha^2), \quad \text{а} \quad \beta = \text{arc tg} \left(\frac{\alpha \sin \varphi}{1 + \alpha \cos \varphi} \right)$$

а тоді рівняння (7) представлять ся остаточно в виді:

$$\begin{aligned}
 1 + \frac{k}{1} \alpha \cos \varphi + \frac{k(k-1)}{1.2} \alpha^2 \cos 2\varphi + \frac{k(k-1)(k-2)}{1.2.3} \cos 3\varphi + \dots \\
 = \sqrt{(1 + 2\alpha \cos \varphi + \alpha^2)^k} \cos k s \\
 \frac{k}{1} \alpha \sin \varphi + \frac{k(k-1)}{1.2} \alpha^2 \sin 2\varphi + \frac{k(k-1)(k-2)}{1.2.3} \sin 3\varphi + \dots \\
 = \sqrt{(1 + 2\alpha \cos \varphi + \alpha^2)^k} \sin k s
 \end{aligned} \tag{8}$$

де s значить найменшу вартість, яку β може прийняти. Та вартість заключена є поміж $-\frac{\pi}{2}$ а $+\frac{\pi}{2}$. Подібно, як β і δ , найде ся вартости на β' і δ' і они будуть $\beta' = \delta$, $\delta' = -\beta$. А тоді рівняння (6) можуть прийняти вид:

$$\begin{aligned}
 1 + \lambda_1 \alpha \cos \Theta_1 + \lambda_2 \alpha^2 \cos \Theta_2 + \dots + \lambda_\mu \alpha^\mu \cos \Theta_\mu + \dots \\
 = e^{\delta k - \beta k'} \cos(\beta k + \delta k') = p. \\
 \lambda_1 \alpha \sin \Theta_1 + \lambda_2 \alpha^2 \sin \Theta_2 + \dots + \lambda_\mu \alpha^\mu \sin \Theta_\mu + \dots \\
 = e^{\delta k - \beta k'} \sin(\beta k + \delta k') = q
 \end{aligned} \tag{9}$$

Отже наш ряд $\varphi(m) = p + qi$ буде:

$$\begin{aligned}
 1 + \frac{m}{1} x + \frac{m(m-1)}{1.2} x^2 + \dots + \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-\mu+1)}{1.2.3\dots\mu} x^\mu + \dots \\
 = e^{\delta k - \beta k'} [\cos(\beta k + \delta k') + i \sin(\beta k + \delta k')]
 \end{aligned}$$

де $m = k + k'i$, а $x = a + bi = \alpha(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

з чого виходить:

$$\alpha = \sqrt{a^2 + b^2}, \alpha \cos \varphi = a, \alpha \sin \varphi = b, \delta = \frac{1}{2} \log(1 + 2a + a^2 + b^2)$$

$$\beta = \text{arc tg} \left(\frac{b}{1+a} \right).$$

Вставивши тоє і кладучи m замість k , а n замість k' , дістанемо на суму ряду:

$$\begin{aligned}
 1 + \frac{m+ni}{1} (a+bi) + \frac{(m+ni)(m+ni-1)}{1.2} (a+bi)^2 + \\
 + \frac{(m+ni)(m+ni-1)(m+ni-2)}{1.2.3} (a+bi)^3 + \dots \\
 + \dots + \frac{(m+ni)(m+ni-1)\dots+(m-\mu+1+ni)}{1.2.3\dots\mu} (a+bi)^\mu + \dots \tag{10}
 \end{aligned}$$

$$= [(1+a)^2 + b^2]^{\frac{m}{2}} e^{-n \operatorname{arctg} \left(\frac{b}{1+a} \right)} \left[\cos \left\{ m \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{b}{1+a} \right) + \frac{1}{2} n \log \left((1+a)^2 + b^2 \right) \right\} \right. \\ \left. + i \sin \left\{ m \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{b}{1+a} \right) + \frac{1}{2} n \log \left((1+a)^2 + b^2 \right) \right\} \right]$$

Виразене то сповняє ся для всяких $\alpha = \sqrt{a^2 + b^2}$ менших чим одиниця.

Для $b = 0$ і $n = 0$ дістанемо ряд поданий в заголовку.

Єслиж $\sqrt{a^2 + b^2}$ є рівне одиниці, тоді наш ряд буде збіжний для всякої вартости m заключеної поміж -1 і $+\infty$, єсли рівночасно не є $\alpha = -1$. Наколиж $\alpha = -1$, то m мусить бути додатне. У всіх иньших случаях ряд є розбіжний.

Ту треба згадати також про другі ряди, якими займав ся Абель.

І так ряд :

$$y = \varphi(0) + \varphi(1)x + \varphi(2)x^2 + \dots + \varphi(n)x^{n-1}$$

— де n є число ціле додатне, скінчене або безконечно велике, а $\varphi(n)$ означає функцію альгебраїчну виміримую величин n , — сумує автор при помочи рядів виду :

$$p = A0^\alpha + Ax + A2^\alpha x^2 + \dots + An^\alpha x^n$$

$$q = \frac{B}{\alpha^\beta} + \frac{Bx}{(\alpha+1)^\beta} + \frac{Bx^2}{(\alpha+2)^\beta} + \dots + \frac{Bx^n}{(\alpha+n)^\beta}$$

котрі на суму дають :

$$\frac{p - A0^\alpha}{A} = x + 2^\alpha x^2 + 3^\alpha x^3 + \dots + n^\alpha x^n =$$

$$= x d(x \cdot d(x \dots d(x \cdot d\left(\frac{x(1-x^n)}{1-x}\right)))$$

$$a \quad \frac{q}{B} = \frac{1}{x^\beta} + \int \frac{dx}{x} \int \frac{dx}{x} \dots \int \frac{dx}{x} \int \frac{dx(x^{\beta-1} - x^{n+\beta})}{1-x}$$


а що ряд даний складавсь з рядів тих двох видів, то і сума цілого ряду буде через них визначена.

Подібно находить і суму ряду :

$$z = f(0)\varphi(0) + f(1)\varphi(1)x + f(2)\varphi(2)x^2 + \dots + f(n)\varphi(n)x^n$$

де $f(n)$ означає функцію яку небудь, а $\varphi(n)$ функцію виміримую.

¹⁾ Oeuvres compl. II. 41.



Окремо займає ся еще автор рядом:

$$\psi(x) = x + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^3}{3^2} + \dots + \frac{x^n}{n^2} + \dots \quad 1)$$

Подає іменно лажандрівські висліди сумованя сего ряду для частных аргументів в границях збіжності $(-1 \dots + 1)$, а відтак сумує сей ряд для аргументу, що є добутком функций двох змінних, а іменно:

$$\psi\left(\frac{x}{1-x} \cdot \frac{y}{1-y}\right) = \psi\left(\frac{y}{1-x}\right) + \psi\left(\frac{x}{1-y}\right) - \psi y - \psi x - \log(1-y) \log(1-x).$$

В тім взорі x і y мусять мати такі вартости, щоби величини: $\left(\frac{x}{1-x} \cdot \frac{y}{1-y}\right)$, $\frac{y}{1-x}$, $\frac{x}{1-y}$, y , x не перевищали одиниці. А то стане ся для додатних x і y , коли $x + y < 1$. — Наколиж $y = -m$, тоді мусять $x + m < 1$, а коли оба і x і y суть від'ємні, тоді вистане, наколи кожде з них є менше чим одиниця.

III. Перейдїм тепер до другої царини аналізи, яку Абель збогав безсмертними дослідами, а се до теорії функций еліптичних, та перегляньмо по черзі єго розвідки в тій області.

1. Перша єго розвідка має заголовок:

Розвязка загального problemu відносячого ся до перетвореня функций еліптичних. (Oeuvres compl. I. 253).

Ту ставить собі Абель за завдане найти всі можливі случаї, в яких сповнить ся рівняне ріжничкове:

$$\frac{dy}{\sqrt{(1-c_1^2 y^2)(1-e_1^2 y^2)}} = \pm a \frac{dx}{\sqrt{(1-c^2 x^2)(1-e^2 x^2)}}$$

наколи за y вставимо функцию альгебраїчну величини x , виміриму або невиміриму.

Задача дуже тяжка на око з огляду на загальність функции y дасть ся спровадити до случаю, коли y є виміриме, змінить ся лиш сочинник a даного рівняня, а прочі величини c_1 і e_1 остануть ті самі.

Положим:

$$\Theta = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-c^2 x^2)(1-e^2 x^2)}}$$

1) Oeuvres compl. II. 249.

то x буде якоюсь функцією величини Θ ; назв'їм її $\lambda\Theta$. Далше назв'їм через $\frac{\omega}{2}$ і $\frac{\omega'}{2}$ вартости Θ для $x = \frac{1}{c}$ і $x = \frac{1}{e}$, а через $\Delta\Theta$ функцію $\sqrt{(1-c^2x^2)(1-e^2x^2)}$.

Тоді на підставі рівняня:

$$\lambda(\Theta \pm \Theta') = \frac{\lambda\Theta \cdot \Delta(\Theta') \pm \lambda\Theta' \cdot \Delta(\Theta)}{(1-c^2e^2\lambda^2\Theta) \cdot \lambda^2\Theta'}$$

де Θ і Θ' означають величини які небудь, і на підставі твердження, що рівняне:

$$\lambda\Theta = \lambda\Theta'$$

сповнить ся, коли положимо:

$$\Theta' = (-1)^{m+m'} \Theta + m\omega + m'\omega'$$

де m і m' є які небудь числа цілковиті додатні або від'ємні, легко буде можна дістати загальне виражене на y і на вартости величин c_1 і e_1 .

Най $y = \psi(x)$ буде функцією вимірною, якої шукаємо, то x виражене яко функція y буде корінем рівняня $y = \psi(x)$; а всі коріні сего рівняня то будуть всі ріжні вартости вираженя:

$$\lambda(\Theta + k_1 a_1 + k_2 a_2 + k_3 a_3 + \dots + k_p a_p)$$

які дістанемо, даючи величинам k_1, k_2, \dots, k_p всі вартости цілковиті, підчас коли a_1, a_2, \dots, a_p мати муть вид: $\mu\omega + \mu'\omega'$ (μ і μ' числа вимірні). Назв'їм вартости повншого вираженя:

$$\lambda\Theta, \lambda(\Theta + a_1), \lambda(\Theta + a_2), \dots, \lambda(\Theta + a_{m-1})$$

і положім $\psi(x) = \frac{p}{q}$ (p і q функції цілковиті величини x без спільного подільника), тоді:

$$p + qy = A(x - \lambda\Theta)(x - \lambda(\Theta + a_1)) \dots (x - \lambda(\Theta + a_{m-1}))$$

а рівняне се сповнить ся для всякої вартости x . А яко сочинник при x^{m-1} буде мати вид $f - gy$, де f і g є величини постійні.

На случай, коли p і q є степеня першого, розвязка нашої задачі може мати слідууючі три види:

$$1) \quad y = ax, \quad c_1^2 = \frac{c^2}{a^2}, \quad e_1^2 = \frac{e^2}{a^2}$$

$$2) \quad y = \frac{a}{ec} \frac{1}{x}, \quad c_1^2 = \frac{c^2}{a^2}, \quad e_1^2 = \frac{e^2}{a^2}$$

$$3) \quad y = m \frac{1-x\sqrt{ec}}{1+x\sqrt{ec}}, \quad c_1 = \frac{1}{m} \frac{\sqrt{c}-\sqrt{e}}{\sqrt{c}+\sqrt{e}}, \quad e_1 = \frac{1}{m} \frac{\sqrt{c}+\sqrt{e}}{\sqrt{c}-\sqrt{e}}, \quad a = \frac{m\sqrt{-1}}{2}(c-e).$$

Для якого-небудь степеня m функції p і q дістанемо:

$$y = \frac{f' + f \cdot \varphi^\Theta}{g' + g \cdot \varphi^\Theta}$$

де f' g' є сочинники при x^{m-1} в p і q , а φ^Θ має вид:

$$\varphi^\Theta = (1 - k)x + \frac{k'' - k'}{e^c} \frac{1}{x} \sum_{\alpha} \frac{2x \Delta(\alpha)}{1 - e^2 c^2 \lambda^2 \alpha \cdot x^2};$$

k , k' і k'' є рівні зеру або одиниці.

З тих перетворень витягає Абель дуже важні твердження, що дотичать еліптичних функцій; і так:

а) Наколи рівнанє:

$$\frac{dy}{\sqrt{(1 - c_1^2 y^2)(1 - e_1^2 y^2)}} = \pm a \frac{dx}{\sqrt{(1 - c^2 x^2)(1 - e^2 x^2)}}$$

сповнить ся через підставленє: $y = \psi(x) = \frac{p}{q}$, де степень функцій p і q є рівний добуткови mn , то всегда буде можна найти функції вимірими φ і f такі, що наколи положимо:

$$x_1 = \varphi(x) = \frac{p'}{q'},$$

то дістанемо:

$$y = f(x_1) = \frac{p_1}{q_1}$$

$$\frac{dx_1}{\sqrt{(1 - c_2^2 x_1^2)(1 - e_2^2 x_1^2)}} = a_1 \frac{dx}{\sqrt{(1 - c^2 x^2)(1 - e^2 x^2)}}$$

$$\frac{dy}{\sqrt{(1 - c_1^2 y^2)(1 - e_1^2 y^2)}} = a_2 \frac{dx_1}{\sqrt{(1 - c_2^2 x_1^2)(1 - e_2^2 x_1^2)}}$$

при чім степень функцій p' і q' є рівний одному з чинників m і n , а степень p_1 і q_1 другому.

б) Який-небудь бувби степень рівняня $p - qu = 0$, то все можна буде дістати вартість x в y дорогою альгебраїчною. Маємо отже одну класу рівнянь, що дадуть ся розвязати альгебраїчно; їх корінї будуть функціями вимірими величин:

$$y, \Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_p$$

де n_1, n_2, \dots, n_p , є перші зглядом себе, а їх добуток рівнаєсь степеневі рівняня даного; r_1, r_2, \dots, r_p мають вид:

$$\xi + t \sqrt{(1-c_1^2 y^2)(1-e_1^2 y^2)}$$

(ξ і t функції цілковиті y).

в) Коли шукаєм всіх можливих розвязок рівняня:

$$\frac{dy}{\sqrt{(1-c^2 y^2)(1-e^2 y^2)}} = a \frac{dx}{\sqrt{(1-c^2 x^2)(1-e^2 x^2)}}$$

і оно дасть розвязку альгебраїчну що до x і y без згляду на те, чи y дасть ся представити вимірно через x чи ні, то величина постійна a буде мати вид $\mu' + \sqrt{-\mu}$, де μ і μ' є числа вимірими, а μ є все додатне. При такій вартости на a можна найти безконачне число ріжних вартостей e і c , що будуть сповняти наше рівняне, а всі они дадут ся виразити через коріні.

г) Через введенє нових змінних перейде рівняне на:

$$\frac{d\psi}{\sqrt{1-b^2 \sin^2 \psi}} = a \frac{d\varphi}{\sqrt{1-c^2 \sin^2 \varphi}}$$

Наколи заложимо φ і ψ дійсне, а модул $c < 1$, а надто рівняне дістане на інтеграл функцію альгебраїчну що до $\sin \varphi$ і $\sin \psi$, то a буде квадративим корінем з додатної вимірної величини.

Яко додаток до попередних перетворень функцій еліптичних випроваджує Абель теорему:

Щоби рівняне:

$$\frac{dy}{\sqrt{(1-y^2)(1-c_1^2 y^2)}} = a \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-c^2 x^2)}}$$

сповнити рівнянем альгебраїчним о змінних x і y , при чім модули c і c_1 є менші як 1, а сочинник a дійсний або мнимий, потреба, а заразом вистарчає, щоби ті модули так були звязані з собою, щоби одно з виражень $\frac{\omega_1}{\tilde{\omega}_1}$ і $\frac{\tilde{\omega}_1}{\omega_1}$ дало ся виразити вимірно через $\frac{\omega}{\tilde{\omega}}$,

$$\text{де } \frac{\omega}{2} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-c^2 x^2)}}$$

$$\text{а } \frac{\tilde{\omega}}{2} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-b^2 x^2)}}$$

$$b_1 = \sqrt{1-c^2}$$

а де ω_1 і $\tilde{\omega}_1$ відносять ся до модулів c_1 і b_1 .

2. В окремій розвідці випроваджує Абель :

Число перетворень функції еліптичної одержаних через підставлене функції вимірної, котрої степеь є числом першим. (Oeuvres compl. I. 309).

Приймим, що рівняне

$$\frac{dy}{\Delta'} = a \frac{dx}{\Delta} \quad (1)$$

де $\Delta' = (1-y^2)(1-c_1^2 y^2)$, $\Delta = (1-x^2)(1-c^2 x^2)$

сповнить ся, коли за y підставимо функцію виміриму x виду :

$$y = \frac{A_0 + A_1 x + \dots + A_{2n+1} x^{2n+1}}{B_0 + B_1 x + \dots + B_{2n+1} x^{2n+1}}$$

де $2n+1$ є числом першим, а бодай один з сочвників A_{2n+1} і B_{2n+1} є ріжний від зера. Найзагальнійшим розв'язанем рівняня (1) буде для $B_{2n+1} = 0$:

$$y = a \frac{x \left(1 - \frac{x^2}{\lambda^2 \alpha}\right) \left(1 - \frac{x^2}{\lambda^2 2\alpha}\right) \dots \left(1 - \frac{x^2}{\lambda^2 n\alpha}\right)}{(1 - c^2 \lambda^2 \alpha x^2) [1 - c^2 \lambda^2 (2\alpha) x^2] \dots [1 - c^2 \lambda^2 (n\alpha) x^2]}$$

$$c_1 = c^{2n+1} \left[\lambda \left(\frac{\omega}{2} + a\right) \lambda \left(\frac{\omega}{2} + 2a\right) \dots \lambda \left(\frac{\omega}{2} + na\right) \right]^4$$

$$a = \frac{c^{n+\frac{1}{2}}}{\sqrt{c_1}} (\lambda a \cdot \lambda(2a) \cdot \dots \cdot \lambda(na))^2 \quad (2)$$

де $a = \frac{m\omega + m'\omega}{2n+1}$, $\frac{\omega}{2} = \int_0^1 \frac{dx}{\Delta}$, $\frac{\omega'}{2} = \int_0^c \frac{dx}{\Delta}$

а m і m' суть числами цілими.

Всі прочі вартости на y будуть виду $\frac{f' + fy}{g' + gy}$, де y подане через (2) а f' , f , g' і g суть величинами постійними, сповняючими рівняне :

$$\left(1 + \frac{g+f}{g'+f'} x\right) \left(1 + \frac{g-f}{g'-f'} x\right) \left(1 + \frac{g+c'f}{g'+c'f'} x\right) \left(1 + \frac{g-c'f}{g'-c'f'} x\right) = (1-x^2)(1-c'^2 x^2).$$

Рівняне то дає 24 системів вартостей ріжних поміж собою. Отже найдемо, що кожній вартости a відповідає 24 вартостей y і 12 вартостей модулу c_1 ; але позаяк що дві вартости y суть рівні, лише противних знаків, то число ріжних вартостей y буде 12, а так само число вартости c_1 буде рівнати ся шість. Кожній

вартости c_1 відповідають дві різні вартости функції y . Отже коли числам m і m' дамо якінебудь вартости цілковиті, дістанемо всі можливі розв'язання нашого problemu.

3. Дальша розвідка з теорії функцій еліптичних носить заголовок:

Досліди над функціями еліптичними. (Oeuvres compl. I. 141).

На вступі подає Абель коротку історію функцій еліптичних від часу Euler'a, що виводив ті функції до математики доказавши спроможности інтегрування рівняня:

$$\frac{dx}{\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \epsilon x^4}} + \frac{dx}{\sqrt{\alpha + \beta y + \gamma y^2 + \delta y^3 + \epsilon y^4}} = 0$$

аж по часи Legendre'a, котрий показав, що всякий інтеграл еліптичний т. є. інтеграл

$$\int \frac{R dx}{\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \epsilon x^4}}$$

де R є функцією вимірюемою, а $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ величини постійні дійсні, можна звести до одного з трох видів:

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{1 - c^2 \sin^2 \theta}}, \quad \int d\theta (1 - c^2 \sin^2 \theta), \quad \int \frac{d\theta}{(1 + n \sin^2 \theta) \sqrt{1 - c^2 \sin^2 \theta}}$$

т. є. інтеграл першого, другого і третього виду.

Абель займає ся в своїй розвідці функцією відвотною, функцією $\varphi(x)$ означеною рівнянями:

$$x = \int \frac{d\theta}{\sqrt{1 - c^2 \sin^2 \theta}}$$

$$\sin \theta = \varphi(x) = x$$

а надавши їй вид:

$$a = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1 - c^2 x^2)(1 + e^2 x^2)}}$$

або:

$$\varphi'(a) = \sqrt{(1 - c^2 \varphi^2 a)(1 + e^2 \varphi^2 a)}$$

займає ся прикметами трох функцій

$$\varphi a, \quad f a = \sqrt{1 - c^2 \varphi^2 a}, \quad F a = \sqrt{1 + e^2 \varphi^2 a}.$$

Деякі з тих прикмет виходять безпосередно з відомих прикмет інтегралів першого виду, інші є менше видні.

І так справджує теорем додавання для функцій φ , f , F , впроваджує їх періодичність, через що стає нам відоме заховане ся функцій на цілім необмеженім просторі змінної дійсної і мнимой, накопи знаєм заховане ся функції для вартостей дійсних в границях $\frac{\omega}{2}$ і $-\frac{\omega}{2}$, а для вартостей мнмих в границях $\frac{\tilde{\omega}}{2}$ і $-\frac{\tilde{\omega}}{2}$; дальше впроваджує Абель, що рівняня $\varphi\alpha = 0$, $f\alpha = 0$, $F\alpha = 0$ мають безконечне число корінїв, перше з них в виді:

$$\alpha = m\omega + n\tilde{\omega}i,$$

друге:
$$\alpha = \left(m + \frac{1}{2}\right)\omega + n\tilde{\omega}i,$$

третє:
$$\alpha = m\omega + \left(n + \frac{1}{2}\right)\tilde{\omega}i;$$

се є вже всі корінї тих рівнянь.

Одною з найбільше характеристичних прикмет тих функцій є, що $\varphi(m\alpha)$, $f(m\alpha)$, $F(m\alpha)$, де m є числом цілим, можна виразити вимірно через $\varphi\alpha$, $f\alpha$, $F\alpha$ (теорем множення). Але случай відворотний не має місця, бо рівняня, які виражають $\varphi(m\alpha)$, $f(m\alpha)$, $F(m\alpha)$, є взагалі рівнянями висших степенїв, огже відвернення не є однозначні. Але корінї тих рівнянь дадуть ся виразити при помочи φ , f , F і то коли $m = 2n$ (паристе), то:

$$\varphi\alpha = x = \pm \varphi \left[(-1)^{m'+\mu'}\alpha + \frac{m'}{2n}\omega + \frac{\mu'}{2n}\tilde{\omega}i \right]$$

де m' і μ' є додатні, менші від $2n$. Отже всі різні вартости на x дістанемо кладучи за m' і μ' всі вартости $(0 \dots \dots 2n-1)$; число корінїв є $8n^2$. — Колиж $m = 2n+1$ (непаристе), тоді:

$$x = \varphi \left[(-1)^{\mu'+m'}\alpha + \frac{m'}{2n+1}\omega + \frac{\mu'}{2n+1}\tilde{\omega}i \right],$$

де за m' і μ' треба класти всі вартости цілковиті $(-n \dots \dots +n)$; число корінїв є тоді $(2n+1)^2$.

Так само:

$$y = f\alpha = f \left[\alpha + \frac{2m'}{m}\omega + \frac{\mu'}{m}\tilde{\omega}i \right]$$

(m' і μ' цілковиті менші від m); корінїв буде m^2 .

А:
$$z = F\alpha = F \left[\alpha + \frac{m'}{m}\omega + \frac{2\mu'}{m}\tilde{\omega}i \right]$$

(m' і μ' цілковиті додатні, менші від m); корінїв буде m^2 .

Через розв'язку тих рівнянь доходить Абель до представлення функцій $\varphi\left(\frac{\alpha}{m}\right)$, $f\left(\frac{\alpha}{m}\right)$, $F\left(\frac{\alpha}{m}\right)$ при помочи функцій $\varphi(\alpha)$, $f(\alpha)$, $F(\alpha)$. Задачу ту ділить він на дві частини, при чім шукає вираження наперед для $\varphi\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, $f\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, $F\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ при помочи $\varphi\alpha$, $f\alpha$, $F\alpha$, а відтак для $\varphi\left(\frac{\alpha}{2n+1}\right)$, $f\left(\frac{\alpha}{2n+1}\right)$, $F\left(\frac{\alpha}{2n+1}\right)$ при помочи $\varphi\alpha$, $f\alpha$, $F\alpha$, бо всяке число мож розбити на $2^v(2n+1)$.

В першій случаю приходять в вираженю самі лиш корінї квадратів, в другім треба розв'язати рівняне степеня $(2n+1)^2$, а розв'язка та, як доказує Абель, дасть ся все перевести альгебраїчно. Вираження, якими представлені є корінї сего рівняня, заключають дві величини постійні, що завсять від рівняня степеня $(2n+1)^2 - 1$. Та розв'язка сего рівняня дасть ся звести до розв'язки лиш одного рівняня степеня $2n+2$; тільки се рівняне не дасть ся взагалі розв'язати альгебраїчно.

Та в дуже многих случаях розв'язка альгебраїчна є можлива, пр. коли: $e = c$, $e = c\sqrt{3}$, $e = c(2 \pm \sqrt{3})$ і т. д.

Першим з тих случаїв займає ся Абель і стосує сей случай до геометрії, щоби при помочи ліній і циркуля поділити округ лемніскати на m рівних частин, наколи $m = 2^n$, або 2^{n+1} , або коли m є добутком більше чисел тих обох видів. Є се той сам теорем, який стосував Gauss до кола.

Функції $\varphi(n\alpha)$, $f(n\alpha)$, $F(n\alpha)$ можна представити в ріжнім виді.

Назначім через $\sum_k^{k'} \psi(m)$ суму, а через $\prod_{m=k}^{k'} \psi(m)$ добуток всіх $\psi(m)$, які одержимо кладучи за m всі вартости цілковиті ($k \dots k'$),

далі через $\sum_k^{k'} \sum_v^{v'} \psi(m\mu)$ суму, а через $\prod_{m=k}^{k'} \prod_{\mu=v}^{v'} \psi(m\mu)$ добуток всіх вартостей функції $\psi(m\mu)$, які одержимо кладучи за m всі вартости цілковиті від k до k' , а за μ всі вартости цілковиті від v до v' , тоді наші функції представлять ся в виді сум:

$$\varphi(2n+1)\alpha = \frac{1}{2n+1} \sum_{-n}^{+n} \sum_{-n}^{+n} (-1)^{m+\mu} \varphi\left(\alpha + \frac{m\omega + \mu\omega i}{2n+1}\right)$$

$$f(2n+1)\alpha = \frac{(-1)^n}{2n+1} \sum_{-n}^{+n} \sum_{-n}^{+n} \mu (-1)^{\mu} f\left(\alpha + \frac{m\omega + \mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)$$

$$F(2n+1)\alpha = \frac{(-1)^n}{2n+1} \sum_{-n}^{+n} \sum_{-n}^{+n} \mu (-1)^{\mu} F\left(\alpha + \frac{m\omega + \mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)$$

або в виді добутків:

$$\begin{aligned} \varphi(2n+1)\alpha &= (2n+1)\varphi\alpha \prod_{m=1}^n \frac{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{m\omega}{2n+1}\right)}}{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\bar{\omega}}{2}i + \frac{m\omega}{2n+1}\right)}} \cdot \\ &\quad \cdot \prod_{\mu=1}^n \frac{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}}{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\bar{\omega}}{2} + \frac{\mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}} \cdot \\ &\quad \cdot \prod_{m=1}^n \prod_{\mu=1}^n \frac{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{m\omega + \mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}}{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\bar{\omega}}{2}i + \frac{m\omega + \mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}} \frac{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{m\omega - \mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}}{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\bar{\omega}}{2} + \frac{m\omega - \mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}} \\ f(2n+1)\alpha &= f\alpha \prod_{m=1}^n \frac{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{m\omega}{2n+1}\right)}}{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\bar{\omega}i}{2} + \frac{m\omega}{2n+1}\right)}} \cdot \\ &\quad \cdot \prod_{\mu=1}^n \frac{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}}{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\bar{\omega}i}{2} + \frac{\mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}} \cdot \\ &\quad \cdot \prod_{m=1}^n \prod_{\mu=1}^n \frac{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{m\omega + \mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}}{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\bar{\omega}i}{2} + \frac{m\omega + \mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}} \frac{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{m\omega - \mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}}{1 - \frac{\varphi^2\alpha}{\varphi^2\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\bar{\omega}i}{2} + \frac{m\omega - \mu\bar{\omega}i}{2n+1}\right)}} \end{aligned}$$

$$F(2n+1)\alpha = F\alpha \prod_{m=1}^n \frac{1 - \frac{\varphi^2 \alpha}{\varphi^2 \left(\frac{\tilde{\omega}}{2} i + \frac{m\omega}{2n+1} \right)}}{1 - \frac{\varphi^2 \alpha}{\varphi^2 \left(\frac{\omega}{2} + \frac{\tilde{\omega} i}{2} + \frac{m\omega}{2n+1} \right)}} .$$

$$\cdot \prod_{\mu=1}^n \frac{1 - \frac{\varphi^2 \alpha}{\varphi^2 \left(\frac{\tilde{\omega} i}{2} + \frac{\mu \tilde{\omega} i}{2n+1} \right)}}{1 - \frac{\varphi^2 \alpha}{\varphi^2 \left(\frac{\omega}{2} + \frac{\tilde{\omega} i}{2} + \frac{\mu \tilde{\omega} i}{2n+1} \right)}} .$$

$$\cdot \prod_{m=1}^n \prod_{\mu=1}^n \frac{1 - \frac{\varphi^2 \alpha}{\varphi^2 \left(\frac{\tilde{\omega} i}{2} + \frac{m\omega + \mu \tilde{\omega} i}{2n+1} \right)}}{1 - \frac{\varphi^2 \alpha}{\varphi^2 \left(\frac{\omega}{2} + \frac{\tilde{\omega} i}{2} + \frac{m\omega + \mu \tilde{\omega} i}{2n+1} \right)}} \frac{1 - \frac{\varphi^2 \alpha}{\varphi^2 \left(\frac{\tilde{\omega} i}{2} + \frac{m\omega - \mu \tilde{\omega} i}{2n+1} \right)}}{1 - \frac{\varphi^2 \alpha}{\varphi^2 \left(\frac{\omega}{2} + \frac{\tilde{\omega} i}{2} + \frac{m\omega - \mu \tilde{\omega} i}{2n+1} \right)}} .$$

Се є вартости для $\varphi(m\alpha)$, $f(m\alpha)$, $F(m\alpha)$, коли m є числом непарним; аналогічні взори вийдуть і для m парного.

Наколи підставимо в тих взорах $\alpha = \frac{\beta}{2n+1}$, дістанемо взори на функції $\varphi\beta$, $f\beta$, $F\beta$, які зі згляду на неозначене число n можуть змінити ся на безконечно много способів. Поміж всіми тими взорами заслугоють на увагу ті, які випадуть, коли вставимо $n = \infty$. Тоді дістанемо на функції $\varphi\alpha$, $f\alpha$, $F\alpha$ вираженя зложені з безконечно много виразів; і так з взорів на суми дістанемо безконечні ряди:

$$\varphi\alpha = \frac{1}{e\varsigma} \sum_{\mu=0}^{\infty} (-1)^{\mu} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \left(\frac{(2\mu+1)\omega}{[\alpha - (m+\frac{1}{2})\omega]^2 + (\mu+\frac{1}{2})^2 \tilde{\omega}^2} - \frac{(2\mu+1)\tilde{\omega}}{[\alpha + (m+\frac{1}{2})\omega]^2 + (\mu+\frac{1}{2})^2 \tilde{\omega}^2} \right)$$

$$f\alpha = \frac{1}{e} \sum_{\mu=0}^{\infty} \left\{ \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{2[\alpha - (m - \frac{1}{2})\omega]}{[\alpha - (m + \frac{1}{2})\omega]^2 + (\mu + \frac{1}{2})^2 \bar{\omega}^2} - \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{2[\alpha + (m + \frac{1}{2})\omega]}{[\alpha + (m + \frac{1}{2})\omega]^2 + (\mu + \frac{1}{2})^2 \bar{\omega}^2} \right\}$$

$$F\alpha = \frac{1}{c} \sum_{m=0}^{\infty} \left\{ \sum_{\mu=0}^{\infty} (-1)^{\mu} \frac{(2\mu + 1)\bar{\omega}}{[\alpha - (m + \frac{1}{2})\omega]^2 + (\mu + \frac{1}{2})^2 \bar{\omega}^2} + \sum_{\mu=0}^{\infty} (-1)^{\mu} \frac{(2\mu + 1)\bar{\omega}}{[\alpha + (m + \frac{1}{2})\omega]^2 + (\mu + \frac{1}{2})^2 \bar{\omega}^2} \right\}$$

а з вгорів на добутки:

$$\varphi\alpha = \alpha \prod_{\mu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\alpha^2}{\mu^2 \bar{\omega}^2} \right) \prod_{m=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\alpha^2}{\mu^2 \omega^2} \right) \prod_{m=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(\alpha + m\omega)^2}{\mu^2 \omega^2} \right) \prod_{m=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(\alpha - m\omega)^2}{\mu^2 \bar{\omega}^2} \right) \left\{ \frac{1 + \frac{(m - \frac{1}{2})^2 \omega^2}{m^2 \omega^2}}{1 + \frac{(\alpha - m\omega)^2}{\mu^2 \bar{\omega}^2}} \right\}^2$$

$$f\alpha = \prod_{m=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\alpha^2}{(m - \frac{1}{2})^2 \omega^2} \right) \prod_{m=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\alpha^2}{(m - \frac{1}{2})^2 \bar{\omega}^2} \right) \prod_{m=1}^{\infty} \left(1 + \frac{[\alpha + (m - \frac{1}{2})\omega]^2}{\mu^2 \omega^2} \right) \prod_{m=1}^{\infty} \left(1 + \frac{[\alpha - (m - \frac{1}{2})\omega]^2}{\mu^2 \bar{\omega}^2} \right) \left\{ \frac{1 + \frac{(m - \frac{1}{2})^2 \omega^2}{m^2 \omega^2}}{1 + \frac{(\alpha - m\omega)^2}{\mu^2 \bar{\omega}^2}} \right\}^2$$

$$F\alpha = \prod_{\mu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\alpha^2}{(\mu + \frac{1}{2})^2 \bar{\omega}^2} \right) \prod_{\mu=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\alpha^2}{(\mu + \frac{1}{2})^2 \omega^2} \right) \prod_{\mu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(\alpha + m\omega)^2}{(\mu + \frac{1}{2})^2 \bar{\omega}^2} \right) \prod_{\mu=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(\alpha - m\omega)^2}{(\mu + \frac{1}{2})^2 \omega^2} \right) \left\{ \frac{1 + \frac{(m - \frac{1}{2})^2 \omega^2}{m^2 \omega^2}}{1 + \frac{(\alpha - m\omega)^2}{\mu^2 \bar{\omega}^2}} \right\}^2$$

Через застосоване функцій виложничих та колових до повисших вгорів дійдем до вще простійших виражень на функції $\varphi\alpha$, $f\alpha$, $F\alpha$:

$$\varphi\alpha = \frac{\omega}{\pi} \sin\left(\frac{\alpha\pi}{\omega}\right) \prod_{m=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{4 \sin^2\left(\frac{\alpha\pi}{\omega}\right)}{\left(e^{\frac{m\tilde{\omega}\pi}{\omega}} - e^{-\frac{m\tilde{\omega}\pi}{\omega}}\right)^2}}{1 - \frac{4 \sin^2\left(\frac{\alpha\pi}{\omega}\right)}{\left(e^{\frac{(2m-1)\tilde{\omega}\pi}{2\omega}} + e^{-\frac{(2m-1)\tilde{\omega}\pi}{2\omega}}\right)^2}}$$

$$F\alpha = \prod_{m=0}^{\infty} \frac{1 + \frac{4 \sin\left(\frac{\alpha\pi}{\omega}\right)}{\left(e^{\frac{(2m+1)\tilde{\omega}\pi}{2\omega}} - e^{-\frac{(2m+1)\tilde{\omega}\pi}{2\omega}}\right)^2}}{1 - \frac{4 \sin\left(\frac{\alpha\pi}{\omega}\right)}{\left(e^{\frac{(2m+1)\tilde{\omega}\pi}{2\omega}} - e^{-\frac{(2m+1)\tilde{\omega}\pi}{2\omega}}\right)^2}}$$

$$f\alpha = \cos\left(\frac{\alpha\pi}{\omega}\right) \prod_{m=1}^{\infty} \frac{1 - \frac{4 \sin^2\left(\frac{\alpha\pi}{\omega}\right)}{\left(e^{\frac{m\tilde{\omega}\pi}{\omega}} + e^{-\frac{m\tilde{\omega}\pi}{\omega}}\right)^2}}{1 - \frac{4 \sin^2\left(\frac{\alpha\pi}{\omega}\right)}{\left(e^{\frac{(2m-1)\tilde{\omega}\pi}{2\omega}} + e^{-\frac{(2m-1)\tilde{\omega}\pi}{2\omega}}\right)^2}}$$

А вже найпростійший вид після Абеля буде:

$$\lambda\left(\frac{\omega'}{\pi}x\right) = \frac{4\pi}{c\omega'} \sqrt{q} \left(\sin x \frac{1}{1-q} + \sin 3x \frac{q}{1-q^3} + \sin 5x \frac{q}{1-q^5} + \dots \right)$$

$$\lambda'\left(\frac{\omega'}{\pi}x\right) = \frac{4\pi}{c^2\omega'} \sqrt{q} \left(\cos x \frac{1}{1+q} + \cos 3x \frac{q}{1+q^3} + \cos 5x \frac{q}{1+q^5} + \dots \right)$$

$$\text{де } q = e^{-\frac{\tilde{\omega}'}{\omega'}\pi}, \quad \sqrt[4]{c} = \frac{1-r}{1+r} \frac{1-r^3}{1+r^3} \frac{1-r^5}{1+r^5} \dots, \quad r = e^{-\pi i - \frac{\omega'}{\tilde{\omega}'}\pi}$$

а де λ і λ' означають функції, на які перейде φ і f , коли за α підставимо $1 - \frac{2\pi}{x}$.

На підставі повнішого вираження на модуль c дійдем до відношення загального між модулями; а іменно, коли функція еліптична має модуль: $\sqrt[4]{c} = \frac{1-\gamma}{1+\gamma} \frac{1-\gamma^3}{1+\gamma^3} \frac{1-\gamma^5}{1+\gamma^5} \dots$, то модуль кожної иньшої функції еліптичної дасть ся перетворити на перший, наколи в виражене на c вставимо на місце γ $\gamma^{\frac{n}{m}}$, де n і m є які небудь два числа цілковиті додатні.

Legendre показав в своїх „Exercises de calcul integral“, як можна замінити інтеграл:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-c^2x^2)}}$$

на иньші інтеграли того самого виду з ріжними модулями. Тоту теорію згенералізував Абель доказавши, що наколи назначимо:

$$\alpha = \frac{(m+\mu)\omega + (m-\mu)\tilde{\omega}i}{2n+1}$$

де бодай одно з поміж чисел m і μ є перше зглядом $(2n+1)$, то дістанемо:

$$\int \frac{dy}{\sqrt{(1-c_1^2y^2)(1+e_1^2y^2)}} = \pm a \int \frac{dx}{\sqrt{(1-c^2x^2)(1+e^2x^2)}}$$

де:

$$y = f.x \cdot \frac{(\varphi^2\alpha - x^2)(\varphi^22\alpha - x^2) \dots (\varphi^2n\alpha - x^2)}{(1+e^2c^2\varphi^2\alpha x^2)(1+e^2c^2\varphi^22\alpha x^2) \dots (1+e^2c^2\varphi^2n\alpha x^2)}$$

$$\frac{1}{c_1} = \frac{f}{c} \left[\varphi\left(\frac{\omega}{2} + \alpha\right) \varphi\left(\frac{\omega}{2} + 2\alpha\right) \dots \varphi\left(\frac{\omega}{2} + n\alpha\right) \right]^2$$

$$\frac{1}{e_1} = \frac{f}{e} \left[\varphi\left(\frac{\tilde{\omega}i}{2} + \alpha\right) \varphi\left(\frac{\tilde{\omega}i}{2} + 2\alpha\right) \dots \varphi\left(\frac{\tilde{\omega}i}{2} + n\alpha\right) \right]^2$$

$$a = f(\varphi\alpha \cdot \varphi2\alpha \cdot \varphi3\alpha \dots \varphi n\alpha)^2$$

де f є неозначене, c_1 і e_1 є виражене через c і e при помочи функції φ так, що існує лиш одно відношене поміж тими величинами. Відношене се можна представити також при помочи рівняня альгебраїчного. Величини e_1 і c_1 можуть приймати усякі вартости кромі 0 і ∞ .

На основі повніших взорів можна при помочи функцій φ , f , F дістати безконечне число перетворень, що є великої ваги в зіставленю повної теорії перетворень функцій еліптичних.

4. Дальша розвідка Абеля з теорії функцій еліптичних під заголовком: „Теория функций эллиптических“ ділить ся на дві часті. (Oeuvr. compl. I. 326.)

Перша часть говорить про функції еліптичні яко інтеграли неозначені і не згадує ся в ній нічо про природу величин дійсних або мнимих, з яких ті функції ся складають. В тій части послу-гуєсь Абель слідуючими означеннями:

$$\Delta(x, c) = \pm \sqrt{(1-x^2)(1-c^2x^2)}$$

$$\tilde{\omega}(x, c) = \int \frac{dx}{\Delta(x, c)}, \quad \tilde{\omega}_0(x, c) = \int \frac{x^2 dx}{\Delta(x, c)}$$

$$II(x, c, a) = \int \frac{dx}{\left(1 - \frac{x^2}{c^2}\right) \Delta(x, c)}$$

так що $\tilde{\omega}(x, c)$, $\tilde{\omega}_0(x, c)$, $II(x, c, a)$ означають функції першого, другого і третього виду.¹⁾

Часть друга говорить про функції о модулах дійсних меньших як одиниця. На місце функцій $\tilde{\omega}$, $\tilde{\omega}_0$ і II впроваджує Абель три иньші, а се функцію $\lambda(\Theta)$ означену рівнянем:

$$\Theta = \int_0^{\lambda\Theta} \frac{dx}{\Delta(x, c)}$$

отже функцію відвернену першого виду, і дві функції:

$$\tilde{\omega}_0(x, c) = \int (\lambda\Theta)^2 d\Theta$$

$$II(x, c, a) = \int \frac{\Delta\Theta}{1 - \frac{\lambda^2\Theta}{a^2}}$$

які одержимо кладучи в вираженях на $\tilde{\omega}_0(x, c)$ і $II(x, c, a)$ $x = \lambda\Theta$.

а) Часть перша. Функції еліптичні мають ту прикмету, що суму кількох-небудь тих функцій можна виразити через одну лише функцію того самого виду з додатком якогось вираженя алгебраїчного і логаритмічного. Коли ψx буде представляти яку-небудь функцію виду:

¹⁾ се властиво не є функції, але інтеграли еліптичні.

$$\psi x = \int \left[A + Bx^2 + \frac{a}{1 - \frac{x^2}{a^2}} + \frac{a_1}{1 - \frac{x^2}{a_1^2}} + \dots + \frac{a_r}{1 - \frac{x^2}{a_r^2}} \right] \frac{dx}{\Delta x},$$

то :

$$\begin{aligned} \psi x_1 + \psi x_2 + \dots + \psi x_\mu &= C - Br - \frac{aa}{2\Delta a} \log \frac{fa + \varphi a \Delta a}{fa - \varphi a \Delta a} - \\ &- \frac{a_1 a_1}{2\Delta a_1} \log \frac{fa_1 + \varphi a_1 \Delta a_1}{fa_1 - \varphi a_1 \Delta a_1} - \dots - \frac{a_r a_r}{2\Delta a_r} \log \frac{fa_r + \varphi a_r \Delta a_r}{fa_r - \varphi a_r \Delta a_r} \end{aligned}$$

де C є стала інтегрована, p функція алгебраїчна, $f(x)$ і $\varphi(x)$ дві якінебудь функції цілковиті що до x , одна паристого степеня, друга непаристого, о сочинниках змінних.

Окремо для функцій першого, другого і третього виду форма ся перейде по черзі на:

$$\tilde{\omega} x_1 + \tilde{\omega} x_2 + \dots + \tilde{\omega} x_\mu = \tilde{\omega} y + C$$

$$\tilde{\omega}_0 x_1 + \tilde{\omega}_0 x_2 + \dots + \tilde{\omega}_0 x_\mu = \tilde{\omega}_0 y - b_{\mu-1} + C$$

$$P x_1 + P x_2 + \dots + P x_\mu = P y - \frac{a}{2\Delta a} \log \frac{fa + \varphi a \Delta a}{fa - \varphi a \Delta a} + C$$

де $b_{\mu-1}$ є сочинником при найвищій степені x в функції $\varphi(x)$, а :

$$y = \pm \frac{a_0}{x_1 x_2 \dots x_{\mu-1}}$$

(a_0 вираз вільний в $f(x)$); знак $+$ або $-$ залежить від того, чи μ непаристе чи паристе).

$$\tilde{\omega} x = \int \frac{dx}{\Delta x}, \quad \tilde{\omega}_0 x = \int \frac{x^2 dx}{\Delta x}, \quad P x = \int \frac{dx}{\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) \Delta x}.$$

Суму якого-небудь числа функцій еліптичних можна проте представити одною лиш функцією того самого виду з додатком величини постійної для функцій першого виду, а функції логаритмічної для функцій третього виду. — Теорем сей не є новий, бо его поставив ще Legendre.

Теорем сей можна виразити при помочи трох иньших простійших теоремів, дуже важних в своїх застосованях :

1) Коли якийсь інтеграл виду :

$$\int (y_1 dx_1 + y_2 dx_2 + \dots + y_\mu dx_\mu)$$

— де $y_1 y_2 \dots y_\mu$ є функції алгебраїчні величини $x_1 x_2 \dots x_\mu$, зв'язані поміж собою якимсь числом рівнянь алгебраїчних — дасть ся виразити через функції алгебраїчні, логаритмічні, еліптичні в спосіб:

$$\int (y_1 dx_1 + y_2 dx_2 + \dots + y_\mu dx_\mu) = u + A_1 \log v_1 + A_2 \log v_2 + \dots + A_r \log v_r + \alpha_1 \psi_1(t_1) + \alpha_2 \psi_2(t_2) + \dots + \alpha_n \psi_n(t_n),$$

де $A_1 A_2 \dots \alpha_1 \alpha_2 \dots$ є сталі, $u v_1 v_2 \dots t_1 t_2 \dots$ функції алгебраїчні величини $x_1 x_2 \dots$, а $\psi_1 \psi_2 \dots$ якінебудь функції еліптичні, то все буде можна виразити сей інтеграл в спосіб:

$$\delta \int (y_1 dx_1 + y_2 dx_2 + \dots + y_\mu dx_\mu) = r + A' \log q' + A'' \log q'' + \dots + A^{(k)} \log q^{(k)} + \alpha_1 \psi_1(\Theta_1) + \dots + \alpha_n \psi_n(\Theta_n),$$

де δ є число ціле, $\alpha_1 \alpha_2, \dots A' A'' \dots$ сталі, а $\Theta_1, \Delta_1(\Theta_1), \Theta_2, \Delta_2(\Theta_2), \dots \Theta_n, \Delta_n(\Theta_n), q' q'' \dots q^{(k)}$ є функції вимірими величини $x_1 x_2 \dots x_\mu y_1 y_2 \dots y_\mu$.

Теорем сей служить не лиш до розвязки передше поданого теорему загального, але кромі сего є він підставою до застосованя функцій алгебраїчних, логаритмічних і еліптичних до теорії інтегруваня форм ріжничкових алгебраїчних.

2) Коли інтеграл виду:

$$\int (y_1 dx_1 + y_2 dx_2 + \dots + y_\mu dx_\mu)$$

дасть ся виразити функцією алгебраїчною і логаритмічною виду: $u + A_1 \log v_1 + A_2 \log v_2 + \dots + A_r \log v_r$, то $u v_1 v_2 \dots$ все будуть функціями вимірими величини: $x_1 x_2 \dots x_\mu, y_1 y_2 \dots y_\mu$.

Коли отже маєм інтеграл $\int y dx$, де y є з x зв'язане якимсь рівнянем алгебраїчним, то тоді $u v_1 v_2 \dots$ є функціями вимірими величини x і y^1 .

Покладім в відношеню якінебудь заходячим між функціями еліптичними:

¹⁾ Є се „теорем Абелевий“, важний в теорії „інтегралів Абелевих“. На пім основує автор нову теорію інтегруваня форм ріжничкових алгебраїчних. Задачею сеї теорії є виконати всі можливі перетвореня інтегралів форм алгебраїчних при помочи функцій алгебраїчних і логаритмічних. Через се зводять ся до можливо малого числа інтегралів, то представляють в скінченім виді всі інтегралі тої самої класи.

$$\alpha_1 \psi_1(x_1) + \alpha_2 \psi_2(x_2) + \dots + \alpha_\mu \psi_\mu(x_\mu) = u + A_1 \log v_1 + A_2 \log v_2 + \dots + A_r \log v_r, \quad (\text{A})$$

де $\psi_1(x_1), \psi_2(x_2), \dots, \psi_\mu(x_\mu)$ означають функції еліптичні, — $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = x_\mu = x$, а модули тих функцій $c_1 = c_2 = c_3 = \dots = c_\mu = c$, то ліва сторона рівняння (A) буде інтегралом $\int \frac{rdx}{\Delta x}$, де r є функцією вимірною змінної x .

Отже:

3) Коли поміж функціями $\tilde{\omega}x, \tilde{\omega}_0x, \Pi_1x_1, \dots, \Pi_\mu x_\mu$, — де модули функцій першого, другого і третього виду суть ті самі, — заходять відношене:

$$\alpha \tilde{\omega}x + \alpha_0 \tilde{\omega}_0x + \alpha_1 \Pi_1x_1 + \alpha_2 \Pi_2x_2 + \dots + \alpha_\mu \Pi_\mu x_\mu = u + A_1 \log v_1 + A_2 \log v_2 + \dots + A_r \log v_r,$$

то u, v_1, v_2, \dots, v_r все будуть виду $p + q\Delta x$, де p і q суть функціями вимірними x .

Порівнюючи рівняне (A) з рівнянем одержаним з него через різничковане, можемо (A) обнижати, так що число функцій еліптичних в тім рівняню буде маліти, а в кінці через повтаряне дійдемо до рівняня, в котрім будуть приходити лише функції альгебраїчні і логаритмічні.

І так теорем поставлений на самім вступі „части першої“ зводить ся до сповнення рівняня:

$$\psi(x) = \beta_1 \psi_1 y_1 + \beta_2 \psi_2 y_2 + \dots + \beta_n \psi_n y_n + u + A_1 \log v_1 + A_2 \log v_2 + \dots + A_r \log v_r.$$

А щоби се рівняне сповнити в случаю найзагальнішим, потреба:

1) Найти всі случаї, коли дасть ся сповнити рівняне:

$$(1 - y^2)(1 - c'^2 y^2) = p^2(1 - x^2)(1 - c^2 x^2) \quad (1)$$

(p і q функції вимірні неозначеного x , а c і c' величини постійні).

2) Сповнивши рівняне (1), звести три функції $\tilde{\omega}(yc')$, $\tilde{\omega}_0(yc'a)$ $\Pi(yc'a)$ до виду:

$$r + A \tilde{\omega}x + A_0 \tilde{\omega}_0x + A' \Pi(xa') + A'' \Pi(xa'') + \dots$$

де r означає часть альгебраїчну і логаритмічну.

3) Найти умовини потрібні і достаточні, щоби функцію виду:

$$\alpha \tilde{\omega}x + \alpha_0 \tilde{\omega}_0x + \alpha_1 \Pi'(xa') + \alpha_2 \Pi''(xa'') + \dots$$

— де всі функції еліптичні мають той сам модуль — виразити при помочи функцій альгебраїчних і логаритмічних.

Найлекша є умовина послїдна і тому від неї зачнемо.

Взїр, що позволяє функції еліптичні якінебудь всіх трох видів виразити при помочи функцій альгебраїчних і логаритмічних, є:

$$\beta \tilde{\omega}x - \frac{2m_1 \Delta \alpha_1}{\alpha_1} \Pi' \alpha_1 - \frac{2m_2 \Delta \alpha_2}{\alpha_2} \Pi' \alpha_2 - \dots - \frac{2m_n \Delta \alpha_n}{\alpha_n} \Pi' \alpha_n = \log \left(\frac{fx + \varphi x \Delta x}{fx - \varphi x \Delta x} \right) + C$$

де $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ мусять сповняти рівняне:

$$(fx)^2 - (\varphi x)^2 (1-x^2)(1-c^2x^2) = (x^2 - \alpha_1^2)^{m_1} (x^2 - \alpha_2^2)^{m_2} \dots (x^2 - \alpha_n^2)^{m_n}$$

а з поміж функцій fx і φx одна є париста, друга непариста.

Таке є відношенє найзагальнїше поміж функціями відносячима ся до того самого модулу і тої самої змінної. Цікаве, що у взорі повисшїм нема зовсїм функції еліптичної другого виду.

Друга умова, то сповненє рівняня:

$$(1-y^2)(1-c'^2y^2) = r^2(1-x^2)(1-c^2x^2)$$

де y і r суть функціями вимірима величини x . Через підставленє

$$r = \frac{1}{\varepsilon} \frac{dy}{dx}$$

де ε є постійне, можна се рівняне звести до виду:

$$\frac{dy}{\sqrt{(1-y^2)(1-c'^2y^2)}} = \frac{\varepsilon dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-c^2x^2)}}$$

або:

$$\frac{dy}{\Delta(y, c')} = \varepsilon \frac{dx}{\Delta(x, c)}$$

а інтегруючи одержимо:

$$\tilde{\omega}(y, c') = \varepsilon \tilde{\omega}(x, c) + C.$$

Отже коли існує відношенє між якимнебудь числом функцій еліптичних, а c означає модул одной з них довільно вибраной, то поміж прочими функціями найдесь бодай одна о модулі c' така, що між функціями *першого виду* відповідаючими модулам c і c' існує відношенє:

$$\tilde{\omega}(y, c') = \varepsilon \tilde{\omega}(x, c) + C$$

де y є функція вимірима x , а де ε є постійне. Якийнебудь буде степєнь тої функції

$$y = \psi(x) = \frac{p}{q}$$

де p і q суть функціями цілковитими x , то все модуль c' буде мати b вартостей різних між собою, а до кожної вартости модуля c належати будуть дві вартости y . Значить, що функція y буде мати 12 різних вартостей. Вид тої функції буде залежати від вартостей a і b в рівнянню

$$p - qy = (a - by)(z - x)(z - x')(z - x'') \dots (z - x^{(\mu-1)})$$

де a і b суть постійні, а $x', x'', \dots, x^{(\mu-1)}$ суть коренями рівняння $y = \psi(x)$.

І так для b рівного zero, а μ непаристого $\mu = 2n + 1$

$$y = a \frac{x(e_1^2 - x^2)(e_2^2 - x^2) \dots (e_n^2 - x^2)}{(1 - c^2 e_1^2 x^2)(1 - c^2 e_2^2 x^2) \dots (1 - c^2 e_n^2 x^2)}$$

для $b = 0$, а $\mu = 2n$

$$y = \frac{a(1 - \delta_1^2 x^2)(1 - \delta_2^2 x^2) \dots (1 - \delta_n^2 x^2)}{x(1 - c^2 e_1^2 x^2)(1 - c^2 e_2^2 x^2) \dots (1 - c^2 e_{n-1}^2 x^2)}$$

для $a = 0$, а $\mu = 2n + 1$

$$y = \frac{a(1 - c^2 e_1^2 x^2)(1 - c^2 e_2^2 x^2) \dots (1 - c^2 e_n^2 x^2)}{x(e_1^2 - x^2)(e_2^2 - x^2) \dots (e_n^2 - x^2)}$$

для $a = 0$, а $\mu = 2n$

$$y = a \frac{x(1 - c^2 e_1^2 x)(1 - c^2 e_2^2 x^2) \dots (1 - c^2 e_{n-1}^2 x)}{(1 - \delta_1^2 x^2)(1 - \delta_2^2 x^2) \dots (1 - \delta_n^2 x^2)}$$

де e_1, e_2, \dots суть коренями рівняння $e^n = 0$, а e_n є функція величини e така, що:

$$\frac{de_n}{\Delta e_n} = n \frac{de}{\Delta e},$$

а де $\delta_1, \delta_2, \dots$ суть коренями рівняння $q = 0$.

Рівнянню $y = \psi(x)$, де $\psi(x)$ є функцією вимірною x , сповняюче:

$$\frac{dy}{\Delta(y, c')} = \varepsilon \frac{dx}{\Delta(x, c)}$$

має ту прикмету, що дасться розв'язати при помочи самих лиш коренів.¹⁾

Через се дістаємо цілу величезну клясу рівнянь альгебраїчних якихнебудь степенів, що дадуться розв'язати альгебраїчно.

¹⁾ Теорем сей, званий теоремом множення функцій еліптичних, має перворядне значіне в дальшій розвою функцій еліптичних.

На третю умовину відповідає автор, що відношеня якенебудь між функціями еліптичними о модулах c_1, c_2, \dots, c_m , не може істнувати, наколи поміж відповідними функціями першого виду не заходить відношеня:

$$\tilde{\omega}(x, c) = \frac{1}{\varepsilon_1} \tilde{\omega}(y_1, c) = \frac{1}{\varepsilon_2} \tilde{\omega}(y_2, c) = \dots = \frac{1}{\varepsilon_m} \tilde{\omega}(y_m, c_m)$$

де $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_m$ суть величини постійні, а $y_1, y_2, y_3, \dots, y_m$ функції виміримі змінної x .

Але коли якусь функцію еліптичну $\varphi(x)$ о модулі c' мож виразити через другі функції еліптичні о модулах c_1, c_2, \dots, c_m , то все буде мож ту функцію виразити при помочи функцій еліптичних, — всіх з тим самим модулем c , де c є довільно вибраним з поміж модулів c_1, c_2, \dots, c_m . Тота функція представить ся:

$$\varphi y = \int \frac{r dx}{\Delta(xc)}$$

де y і r є функції виміримі змінної x .

б) В частині другій подані лиш самі висліди без доказів, а всі они відносять ся до прикмет функції $\lambda\theta$.

1. Функція $\lambda\theta$ є двоперіодична і має період один дійсний, другий мнимий.

$$\lambda(\theta + 2\tilde{\omega}) = \lambda\theta,$$

$$\lambda(\theta + \omega i) = \lambda\theta$$

де $\frac{\tilde{\omega}}{2} = \int_0^1 \frac{dx}{\Delta(xc)},$ а $\frac{\omega}{2} = \int_0^1 \frac{dx}{\Delta(x, b)}$

$$(b = \sqrt{1-c^2}, \sqrt{-1} = i)$$

2. Функція $\lambda\theta$ стає ся зером і безконечностю для безконечного числа вартостей дійсних і мнимих θ :

$$\lambda(m\tilde{\omega} + n\omega i) = 0,$$

$$\lambda\left(m\tilde{\omega} + \left(n + \frac{1}{2}\right)\omega i\right) = \frac{1}{0}$$

де m і n є числа цілі додатні або відемні.

Дальше для:

$$\theta' = (-1)^m \theta + m\tilde{\omega} + n\omega i$$

$$\lambda\theta' = \lambda\theta.$$

3. Функція $\lambda\theta$ сповняє рівняне:

$$\lambda(\theta' + \theta) \lambda(\theta' - \theta) = \frac{(\lambda\theta')^2 - (\lambda\theta)^2}{1 - c^2 (\lambda\theta)^2 (\lambda\theta')^2}$$

де θ і θ' суть якінебудь величини змінні дійсні або мнимі.

4. Функція $\lambda\theta$ дасть ся розвинути на добуток або суму дробів на багато способів. Приміром кладучи:

$$q = e^{-\frac{\omega}{\bar{\omega}} \pi}, \quad p = e^{-\frac{\bar{\omega}}{\omega} \pi}$$

дістанемо:

$$\begin{aligned} \lambda(\theta\omega) &= \\ &= \frac{2}{\sqrt{c}} \sqrt{q} \sin(\pi\theta) \frac{[1-2q^2\cos(2\theta\pi)+q^4][1-2q^4\cos(2\theta\pi)+q^8][1-2q^6\cos(2\theta\pi)+q^{12}] \dots}{[1-2q\cos(2\theta\pi)+q^2][1-2q^3\cos(2\theta\pi)+q^6][1-2q^5\cos(2\theta\pi)+q^{10}] \dots} \\ &= \frac{4\sqrt{q}}{c} \frac{\pi}{\bar{\omega}} \left[\frac{1}{1-q^2} \sin(\theta\pi) + \frac{q}{1-q^4} \sin(3\theta\pi) + \frac{q^2}{1-q^6} \sin(5\theta\pi) + \dots \right] \\ \lambda\left(\frac{\bar{\omega}}{2} - \theta\omega\right) &= \frac{1}{\sqrt{c}} \frac{(1-pe^{-2\pi\theta})(1-pe^{2\pi\theta})(1-p^3e^{-2\pi\theta})(1-p^3e^{2\pi\theta}) \dots}{(1+pe^{-2\pi\theta})(1+pe^{2\pi\theta})(1+p^3e^{-2\pi\theta})(1+p^3e^{2\pi\theta}) \dots} \end{aligned}$$

Анальоґічно мож представити функцію другого і третого виду.

5. Дуже важна прикмета функції $\lambda\theta$ в слідуєча: (для скороченя підставимо $\Delta\theta = \pm \sqrt{(1-\lambda^2\theta)(1-c^2\lambda^2\theta)}$)

Наколи рівняне:

$$(\lambda\theta)^{2n} + a_{n-1}(\lambda\theta)^{2n-2} + \dots + a_1(\lambda\theta)^2 + a_0 = b_0 \lambda\theta + b_1(\lambda\theta)^3 + \dots + b_{n-2}(\lambda\theta)^{2n-3} \Delta\theta$$

буде сповнене, коли за θ підставимо $2n$ вартостей $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{2n}$, таких що $(\lambda\theta_1)^2, (\lambda\theta_2)^2, \dots, (\lambda\theta_{2n})^2$, суть ріжні поміж собою, тоді буде все:

$$\lambda(\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_{2n}) = 0$$

$$-\lambda(\theta_{2n}) = \lambda(\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_{2n-1}) = \frac{a_0}{\lambda\theta_1 \cdot \lambda\theta_2 \cdot \dots \cdot \lambda\theta_{2n-1}}$$

сочинники $a_0, a_1, \dots, b_0, b_1, \dots$ можуть бути якінебудь, а можна їх визначити, позаяк $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{2n-1}$ в дані.

А отсе також важна прикмета:

Коли покласти

$$p^2 - q^2(1-x^2)(1-c^2x^2) = A(x-\lambda\theta_1)(x-\lambda\theta_2) \dots (x-\lambda\theta_\mu)$$

де p і q в якінебудь функції цілковиті x , то все мож буде вибрати величини $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_\mu$ так, що виражене:

$$\lambda(\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_\mu)$$

буде зером або безконечністю.

Подібно приміром, коли

$$p^2 - x^2(1 - x^2)(1 - c^2x^2) = \Lambda(x^2 - \lambda^2 \Theta)^\mu$$

де одна з функцій p і q , є париста а друга непариста, тоді буде:

а) для p паристого:

$$\lambda(\mu\Theta) = 0, \text{ коли } \mu \text{ є паристе}$$

$$\lambda(\mu\Theta) = \frac{1}{0}, \text{ коли } \mu \text{ є непаристе.}$$

б) для p непаристого

$$\lambda(\mu\Theta) = 0, \text{ коли } \mu \text{ є непаристе}$$

$$\lambda(\mu\Theta) = \frac{1}{0}, \text{ коли } \mu \text{ є паристе;}$$

а з відси виходить, що коли рівняне повнеше має місце, то:

$$\lambda\Theta = \lambda \left(\frac{m\tilde{\omega} + \frac{1}{2}n\omega i}{\mu} \right)$$

де m і n суть цілі і меньші чим μ .

6. Поміж величинами $\lambda \left(\frac{m\tilde{\omega} + n\omega i}{2\mu + 1} \right)$ а коренями одиниці

$(2\mu + 1)$ ими існують дуже цікаві відношеня:

$$0 = \lambda \left(\frac{2m\tilde{\omega} + \omega i}{2\mu + 1} \right) + \delta^k \lambda \left(\frac{2m\tilde{\omega} + 2\omega i}{2\mu + 1} \right) + \delta^{2k} \lambda \left(\frac{2m\tilde{\omega} + 3\omega i}{2\mu + 1} \right) +$$

$$+ \dots + \delta^{2\mu k} \lambda \left(\frac{2m\tilde{\omega} + 2\mu\omega i}{2\mu + 1} \right)$$

$$0 = \lambda \left(\frac{\omega + m\omega i}{2\mu + 1} \right) + \delta^{k'} \lambda \left(\frac{2\tilde{\omega} + m\omega i}{2\mu + 1} \right) + \delta^{2k'} \lambda \left(\frac{3\tilde{\omega} + m\omega i}{2\mu + 1} \right) +$$

$$+ \dots + \delta^{2\mu k'} \lambda \left(\frac{2\mu\tilde{\omega} + m\omega i}{2\mu + 1} \right)$$

де $\delta = \cos \frac{2\pi}{2\mu + 1} + i \sin \frac{2\pi}{2\mu + 1}$, а всі величини $\lambda \left(\frac{m\tilde{\omega} + n\omega i}{2\mu + 1} \right)$

суть коренями одного лиш рівняня степеня: $(2\mu + 1)^2$, котрого сочинники є функциями вимірними c^2 .

7. Коли функция

$$\int \frac{dx}{\Delta(xc)}$$

о модулі c , дійсним і меншим чим одиниця, дасть ся перетворити на иньшу :

$$\varepsilon \int \frac{dy}{\Delta(x, c')}$$

о модулі c' дійсним або мнимім, через підставлене за y якоїнебудь функції альгебраїчної x , тоді модуль c' дасть ся виразити через одно з помежи рівнянь :

$$\sqrt[4]{c'} = \sqrt{2} \sqrt[8]{q_1} \frac{(1+q_1^2)(1+q_1^4)(1+q_1^6)\dots}{(1+q_1)(1+q_1^3)(1+q_1^5)\dots}$$

$$\sqrt[4]{c'} = \frac{1-q_1}{1+q_1} \cdot \frac{1-q_1^3}{1+q_1^3} \cdot \frac{1-q_1^5}{1+q_1^5} \dots$$

де $q_1 = q^{\mu}$, а μ виміримо, або, що на одно вийде :

$$q_1 = e^{\left(\frac{\mu}{\omega} + \mu'i\right)\pi}$$

μ і μ' які небудь числа виміримі.

8. Функція $\lambda\theta$ має застосоване в теорії перетворень. І так при єї помочи показуєсь, що, щоби дві функції дійсні перетворити одну на другу, т. зн. щоби сповнити рівняне :

$$\int \frac{dy}{\Delta(x, c')} = m \frac{\tilde{\omega}'}{\tilde{\omega}} \int \frac{dx}{\Delta(x, c)}$$

потреба, щоби поміж функціями $\tilde{\omega}$, ω , $\tilde{\omega}'$, ω' заходило рівняне :

$$\frac{\tilde{\omega}'}{\omega'} = \frac{n}{m} \frac{\tilde{\omega}}{\omega}$$

де n і m є числа цілі.

9. На увагу заслугує случай, коли один з поміж модулів мож перетворити на єго доповнене $\sqrt{1-c^2} = b$.

В тім случаю будемо мати з узглядненем рівняня :

$$\frac{\tilde{\omega}'}{\omega'} = \frac{n}{m} \frac{\tilde{\omega}}{\omega} \quad :$$

$$\frac{\tilde{\omega}}{\omega} = \sqrt{\frac{m}{n}} \quad \text{і} \quad \frac{dy}{\Delta(y, b)} = \sqrt{mn} \frac{dx}{\Delta(x, c)}$$

Модуль c буде визначений рівнянем альгебраїчним, котре мож розвязати при помочи корінів; бодай так буде дійсно, коли $\frac{m}{n}$ є повним квадратом. У всіх случаях легко виразити c через безко-нечні добутки.

І справді коли

$$\frac{\tilde{\omega}}{\omega} = \sqrt{\frac{m}{n}},$$

тоді маємо:

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{c} &= \sqrt{2} e^{-\frac{1}{3}\pi\sqrt{\frac{m}{n}}} \frac{(1 + e^{-2\pi\sqrt{\frac{m}{n}}})(1 + e^{-4\pi\sqrt{\frac{m}{n}}}) \dots}{(1 + e^{-\pi\sqrt{\frac{m}{n}}})(1 + e^{-3\pi\sqrt{\frac{m}{n}}}) \dots} \\ &= \frac{(1 - e^{-\pi\sqrt{\frac{n}{m}}})(1 - e^{-3\pi\sqrt{\frac{n}{m}}}) \dots}{(1 + e^{-\pi\sqrt{\frac{n}{m}}})(1 + e^{-3\pi\sqrt{\frac{n}{m}}}) \dots} \end{aligned}$$

Коли два модулі c і c' дадуться перетворити один на другий, то вони будуть зв'язані між собою алгебраїчно. Але взагалі буде неможливо виразити c' через c при помочи коренів і тільки в тім случаю буде се можливе, коли c мож перетворити на його доповнене.

Рівняня модулові мають ту прикмету, що всі їх корені мож виразити вимірно при помочи двох з поміж них; а всі корені дадуться виразити через один з помежи них при помочи коренів.

10. Функцію $\lambda\theta$ мож розвинути на:

$$\lambda\theta = \frac{\theta + a\theta^3 + a'\theta^5 + \dots}{1 + b'\theta^4 + b''\theta^6 + \dots}$$

де чисельник і знаменник в рядах збіжними.

Кладучи:

$$\begin{aligned} \varphi\theta &= \theta + a\theta^3 + a'\theta^5 + \dots \\ f\theta &= 1 + b'\theta^4 + b''\theta^6 + \dots \end{aligned}$$

можемо ті функції виразити при помочи рівнянь:

$$\varphi(\theta' + \theta)\varphi(\theta' - \theta) = (\varphi\theta f\theta')^2 - (\varphi\theta' f\theta)^2$$

$$f(\theta' + \theta)f(\theta' - \theta) = (f\theta f\theta')^2 - c^2(\varphi\theta\varphi\theta')^2$$

де θ і θ' в незалежні змінні.

IV. Широко опрацьовує автор теорію переступних функцій еліптичних. Ту належить розвідка:

1. Теорія переступних функцій еліптичних. (Oeuvres compl. II. 93.)

Автор розпочинає зведенем інтеграла

$$\int \frac{Pdx}{\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \varepsilon x^4}}$$

на функції алгебраїчні.

Назв'їм для скороченя корінь через \sqrt{R} та розбираймо:

$$\int \frac{Pdx}{\sqrt{R}}$$

де P значить функцію алыгебраїчну виміриму x .

P мож розложити на члени виду Ax^m і $\frac{A}{(x-a)^m}$, де m є числом цілковитим. Автор розбирає ті інтеграли:

$$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{R}} \quad \text{і} \quad \int \frac{dx}{(x-a)^m \sqrt{R}}$$

спершу окремо, а відтак разом.

а) *Зведенє інтеграла*

$$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{R}}.$$

Пошукаймо загальної функції алыгебраїчної, котрої різничка дасть ся розложити на члени виду

$$\frac{Ax^m dx}{\sqrt{R}},$$

бо тоді інтеграл тої функції так розложеної дасть відношенє загальне поміж інтегралами виду

$$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{R}}.$$

Функція шукана не може заключати иньших коріньв, лише \sqrt{R} , а як функція вимірима величин x , \sqrt{R} буде мати вид:

$$f(x, \sqrt{R}) = Q' + Q\sqrt{R}$$

де Q і Q' суть функціями виміримими x , або опустивши Q' , позаяк оно буде заключати лише самі вираженя виміримі x , дістанемо:

$$f(x, \sqrt{R}) = Q\sqrt{R}.$$

Функція Q мусить бути цілковитою, бо в противнім случаю, колиб заключала член виду $\frac{1}{(x-a)^m}$, тоді різничка вираженя

$$\frac{\sqrt{R}}{(x-a)^m}:$$

$$d \left[\frac{\sqrt{R}}{(x-a)^m} \right] = \left[\frac{\frac{1}{2} \frac{dR}{dx}}{(x-a)^m} - \frac{mR}{(x-a)^{m+1}} \right] \frac{dx}{\sqrt{R}}$$

малаби за сочинник при $\frac{dx}{\sqrt{R}}$ функцію дробову, хіба що R мало-би принайменше два сочинники рівні т. з. інтеграл мавби зовсім иньший вид, бо $\int \frac{Pdx}{\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2}}$.

Тото Q яко цілковита функція альгебраїчна представить ся:

$$Q = f(0) + f(1)x + f(2)x^2 + \dots + f(n)x^n;$$

зріжничкуймо найдену функцію $Q\sqrt{R}$, то дістанемо:

$$d(Q\sqrt{R}) = \frac{RdQ + \frac{1}{2}QdR}{dx} \cdot \frac{dx}{\sqrt{R}} = S \frac{dx}{\sqrt{R}},$$

а коли за Q і R підставимо вартости, дістанемо на S якусь функцію цілковиту x степеня m , пр.

$$S = R \frac{dQ}{dx} + \frac{1}{2}Q \frac{dR}{dx} \quad (1)$$

$$= \varphi(0) + \varphi(1)x + \varphi(2)x^2 + \dots + \varphi(m)x^m; \quad (2)$$

з порівняня сочинників (1) і (2) вийдуть вартости на φ :

$$\varphi(p) = (p+1)f(p+1)\alpha + (p+\frac{1}{2})f(p)\beta + pf(p-1)\gamma + (p-\frac{1}{2})f(p-2)\delta + (p-1)f(p-3)\epsilon \quad (3)$$

де $p = 0, 1, 2, 3, \dots, m$.

А що дотичить вартости n , то випадє $m = n + 3$.

І тепер функція наша:

$$Q\sqrt{R} = \int S \frac{dx}{\sqrt{R}}$$

представить ся в видї:

$$\varphi(0) \int \frac{dx}{\sqrt{R}} + \varphi(1) \int \frac{x dx}{\sqrt{R}} + \varphi(2) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}} + \dots + \varphi(m) \int \frac{x^m dx}{R} = \\ = \sqrt{R} (f(0) + f(1)x + f(2)x^2 + \dots + f(m-3)x^{m-3}) \quad (4)$$

То є найзагальнїше відношенє поміж інтегралами виду

$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{R}}$, вираженє функціями альгебраїчними. З рівняня сего мож випровадити всі зведеня (réduction), які інтеграли сего виду допускаяють. Ліва сторона сего рівняня є заразом найбільше загальним

інтегралом виду $\int \frac{Pdx}{\sqrt{R}}$ (Р функція цілковита x), який дасть ся виразити через функції альгебраїчні.

В рівнянню (4) є очевидно $m \geq 3$, бо права сторона є функцією цілковитою x , отже всяке $\int \frac{x^m dx}{\sqrt{R}}$, $m \geq 3$, дасть ся виразити через інтеграли того самого виду о низшім m . Лише

$$\int \frac{dx}{\sqrt{R}}, \int \frac{xdx}{\sqrt{R}}, \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}}$$

суть незведимі при помочи функцій альгебраїчних, і то суть одинокі функції переступні в інтегралі

$\int \frac{Pdx}{\sqrt{R}}$ (Р функція цілковита), (інтеграли абелеві I-го, II-го і III-го виду).

Щоби звести інтеграл $\int \frac{x^m dx}{\sqrt{R}}$, положимо в рівнянню (4) $\varphi(m) = -1$, а позаяк:

$$\varphi(m-1) = \varphi(m-2) = \dots \varphi(3) = 0$$

то:

$$\int \frac{x^m dx}{\sqrt{R}} = \varphi(0) \int \frac{dx}{\sqrt{R}} + \varphi(1) \int \frac{xdx}{\sqrt{R}} + \varphi(2) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}} - \\ - \sqrt{R} (f(0) + f(1)x + f(2)x^2 + \dots + f(m-3)x^{m-3})$$

а сочинники $\varphi(0)$, $\varphi(1)$, $\varphi(2)$, $f(0)$, $f(1)$, \dots , $f(m-3)$ дістанемо з (3) кладучи $p = 0, 1, \dots, m$.

І так приміром $\int \frac{x^4 dx}{\sqrt{R}}$ виразить ся через названі функції переступні ось як:

$$\int \frac{x^4 dx}{\sqrt{R}} = \left(\frac{5}{24} \frac{\beta\delta}{\epsilon^2} - \frac{1}{3} \frac{\alpha}{\epsilon} \right) \int \frac{dx}{\sqrt{R}} \\ + \left(\frac{5}{12} \frac{\gamma\delta}{\epsilon^2} - \frac{1}{2} \frac{\beta}{\epsilon} \right) \int \frac{xdx}{\sqrt{R}} \\ + \left(\frac{5}{8} \frac{\delta^2}{\epsilon^2} - \frac{2}{3} \frac{\gamma}{\epsilon} \right) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}} \\ - \left(\frac{5}{12} \frac{\delta}{\epsilon^2} - \frac{1}{3} \frac{1}{\epsilon} x \right) \sqrt{R}$$

Інтеграл $\int \frac{Pdx}{\sqrt{R}}$ дасть ся, як бачилисьмо, виразити через три функції переступні. Колибсьмо хотіли се число функцій переступних зменьшити, то поміж величинами $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ мусілиби зайти якісь відношеня. Приміром, щоби $\int \frac{Pdx}{\sqrt{R}}$ виразити через функції алыгебраічні, требаби покласти $\varphi(0) = \varphi(1) = \varphi(2) = 0$, а тоді три з поміж $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ виразять ся через дві прочі. Приміром інтеграл $\int \frac{x^4 dx}{\sqrt{R}}$ виражений функціями алыгебраічними буде :

$$\int \frac{x^4 dx}{\sqrt{R}} = - \left(\frac{5}{12} \frac{\delta}{\epsilon^2} - \frac{1}{3} \frac{1}{\epsilon} x \right) \sqrt{R}$$

б) Зведеня інтеграла

$$\int \frac{dx}{(x-a)^m \sqrt{R}}$$

В тім случаю Q яко функція дробова дасть ся розложити на дробі частинні :

$$Q = \frac{\psi(1)}{x-a} + \frac{\psi(2)}{(x-a)^2} + \frac{\psi(3)}{(x-a)^3} + \dots + \frac{\psi(m-1)}{(x-a)^{m-1}}$$

$$d(Q\sqrt{R}) = \int \frac{dx}{\sqrt{R}}$$

де S кладемо :

$$S = \varphi'(0) + \varphi'(1)(x-a) + \varphi'(2)(x-a)^2 + \frac{\chi(1)}{x-a} + \frac{\chi(2)}{(x-a)^2} + \dots + \frac{\chi(m)}{(x-a)^m}$$

а φ і χ суть сочинниками при відповідних степенях $(x-a)$, такі які випадуть з розвиненя.

А інтеграл: $Q\sqrt{R} = \int \frac{dx}{\sqrt{R}}$ представить ся :

$$\begin{aligned} & \varphi(0) \int \frac{dx}{\sqrt{R}} + \varphi(1) \int \frac{x dx}{\sqrt{R}} + \varphi(2) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}} \\ & + \chi(1) \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} + \chi(2) \int \frac{dx}{(x-a)^2 \sqrt{R}} + \dots + \chi(m) \int \frac{dx}{(x-a)^m \sqrt{R}} \\ & = \sqrt{R} \left(\frac{\psi(1)}{(x-a)} + \frac{\psi(2)}{(x-a)^2} + \frac{\psi(3)}{(x-a)^3} + \dots + \frac{\psi(m-1)}{(x-a)^{m-1}} \right) \quad (5) \end{aligned}$$

З сеї форми видно, що

$$\int \frac{dx}{(x-a)^m \sqrt{R}}, \quad m > 1$$

все дасть ся виразити через три інтеграли:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{R}}, \quad \int \frac{xdx}{\sqrt{R}}, \quad \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}} \quad \text{і інтеграл} \quad \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}},$$

та що сей послідний *взагалі* є незведимий. Він дасть ся звести лише через відповідне дібранє величин $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$, подібно, як три попередні функції переступні. Кладучи в (5) $\chi(m) = -1$, $\chi(2) = \chi(3) = \dots = \chi(m-1) = 0$, дістанемо:

$$\int \frac{dx}{(x-a)^m \sqrt{R}} = \varphi(0) \int \frac{dx}{\sqrt{R}} + \varphi(1) \int \frac{xdx}{\sqrt{R}} + \varphi(2) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}} + \chi(1) \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} - \sqrt{R} \left(\frac{\psi(1)}{x-a} + \frac{\psi(2)}{(x-a)^2} + \frac{\psi(3)}{(x-a)^3} + \dots + \frac{\psi(m-1)}{(x-a)^{m-1}} \right) \quad (6)$$

Єслиж $(x-a)$ є чинником функції R , отже R стає зером для $x=a$, тоді (5) не дасть ся застосувати до зведеня інтеграла

$\int \frac{dx}{(x-a)^m \sqrt{R}}$. Та коли за m положимо $m+1$ і в так зміненім взорі

покладемо $m=1$, тоді інтеграл $\int \frac{dx}{(x-a)^m \sqrt{R}}$ дасть ся виразити через $\int \frac{dx}{\sqrt{R}}, \int \frac{xdx}{\sqrt{R}}, \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}}$:

$$\int \frac{dx}{(x-a)^m \sqrt{R}} = \varphi(0) \int \frac{dx}{\sqrt{R}} + \varphi(1) \int \frac{xdx}{\sqrt{R}} + \varphi(2) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}} - \sqrt{R} \left(\frac{\psi(1)}{x-a} + \frac{\psi(2)}{(x-a)^2} + \dots + \frac{\psi(m)}{(x-a)^m} \right) \quad (7)$$

Ві всіх прочих случаях оно є неможливе, позаяк рівняне (6) закладає $m > 1$.

Інтеграл $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$ дасть ся також звести в случаю, коли $(x-a)$ є чинником R . Взір (7) перейде тоді на:

$$\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} = -\frac{a^2+a(a'+a''+a''')}{(a-a')(a-a'')(a-a''')} \int \frac{dx}{\sqrt{R}} - \frac{a+a'+a''+a'''}{(a-a')(a-a'')(a-a''')} \int \frac{xdx}{\sqrt{R}} + \frac{2}{(a-a')(a-a'')(a-a''')} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}} - \frac{2}{(a-a')(a-a'')(a-a''')} \cdot \frac{\sqrt{R}}{x-a} \quad (8)$$

де $R = (x-a)(x-a')(x-a'')(x-a''')$.

Щоби найти відношене поміж інтегралами виду $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$,
положім:

$$\begin{aligned} & \varphi(0) \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} + \varphi(1) \int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}} + \varphi(2) \int \frac{dx}{(x-a'')\sqrt{R}} + \\ & + \varphi(3) \int \frac{dx}{(x-a''')\sqrt{R}} = \sqrt{R} \left(\frac{A}{x-a} + \frac{A'}{x-a'} + \frac{A''}{x-a''} + \frac{A'''}{x-a'''} \right) \\ & \frac{A}{x-a} + \frac{A'}{x-a'} + \frac{A''}{x-a''} + \frac{A'''}{x-a'''} = Q \end{aligned}$$

Та коли в то рівнане підставимо вартости за $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$
і т. д., тоді дістанемо відношене:

$$\begin{aligned} & \varphi(0) \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} + \varphi(1) \int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}} + \varphi(2) \int \frac{dx}{(x-a'')\sqrt{R}} = \\ & = \sqrt{R} \left(\frac{A}{x-a} + \frac{A'}{x-a'} + \frac{A''}{x-a''} \right) \end{aligned} \quad (9)$$

То є відношене між трома якиминебудь з по-
межи інтегралів:

$$\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}, \int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}}, \int \frac{dx}{(x-a'')\sqrt{R}}, \int \frac{dx}{(x-a''')\sqrt{R}}$$

значить, два з поміж них можна виразити через
два другі, наколи $(x-a)$ є чинником R . В противнім
случаю, коли $(x-a)$ не є чинником R , відношене нї-
яке між інтегралами не існує.

Пошукаймо тепер еще, чи інтеграли

$$\int \frac{dx}{\sqrt{R}}, \int \frac{x dx}{\sqrt{R}}, \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}}$$

не дадут ся звести на інтеграли виду $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$ і які відношеня
мусять тоді існувати поміж $\varphi(0)$, $\varphi(1)$, $\varphi(2)$.

Позаяк $(x-a)$ мусить бути чинником R , проте на підставі (9):

$$\begin{aligned} & \varphi(0) \int \frac{dx}{\sqrt{R}} + \varphi(1) \int \frac{x dx}{\sqrt{R}} + \varphi(2) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}} = \\ & = A \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} + A' \int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}} + \sqrt{R} \left(\frac{B}{(x-a)} + \frac{B'}{(x-a')} \right) \end{aligned}$$

Підставивши за $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$ і $\int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}}$ вартости, дістанемо з порівняння сочинників вартости на A, A', B, B' , а межі $\varphi(0), \varphi(1), \varphi(2)$ вийде відношене:

$$2\varepsilon\varphi(1) - \delta\varphi(2) = 0.$$

Кладучи $\varphi(1) = 0$ а $\varphi(0) = 1$ дістанемо $\varphi(2) = 0$, а тоді:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{R}} = \frac{(a-a'')(a-a''')}{(a''+a'''-a-a')} \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} + \frac{(a'-a'')(a'-a''')}{(a''+a'''-a-a')} \int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}} + \frac{2\sqrt{R}}{(a+a'-a''-a''')(x-a)(x-a')} \quad (10)$$

Колиж покладемо $\varphi(0) = 0$, а $\varphi(2) = 1$, тоді $\varphi(1) = \frac{\delta}{2\varepsilon}$ і дістанемо:

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}} + \frac{1}{2}\delta \int \frac{xdx}{\sqrt{R}} = \frac{a'(a'-a-a''-a''')f'(a)}{2(a'-a)(a+a'-a''-a''')} \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} + \frac{a(a-a'-a''-a''')f'(a')}{2(a-a')(a+a'-a''-a''')} \int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}} + \frac{\sqrt{R}}{(a-a')(a+a'-a''-a''')} \cdot \left(\frac{a'(a'-a-a''-a''')}{x-a} - \frac{a(a-a'-a''-a''')}{x-a'} \right) \quad (11)$$

де:

$$f'(a) = \frac{df(a)}{da} \quad f(x) = R.$$

Отже бачимо, що $\int \frac{dx}{\sqrt{R}}$ дасть ся виразити при помочи інтегралів $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$ і $\int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}}$. А вже інтеграл $\int \frac{xdx}{\sqrt{R}}$ і $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}}$ не дадуть ся виразити в сей спосіб. Коли $a+a' = a''+a'''$, то (10) і (11) стають ілюзоричні, а лишаєсь лише рівнане (8); в тім случаю мож найти відношене поміж двома інтегралами виду $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$; оно буде:

$$\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} + \int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}} = \frac{2\sqrt{R}}{(a''-a)(a''-a')(x-a)(x-a')}$$

Дальшою квестією є слідуєча :

Зведеме інтегралу $\int \frac{Pdx}{\sqrt{R}}$ при помочи функцій
льогаїтмічних.

Будемо шукати відношень льогаїтмічних, які мож одержати
поміж чотирома інтегралами $\int \frac{dx}{\sqrt{R}}$, $\int \frac{xdx}{\sqrt{R}}$, $\int \frac{x^2dx}{\sqrt{R}}$, $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$
незведимими при помочи функцій алыгебраїчних. В тій ціли пошу-
каемо загальної функції льогаїтмічної, котрої ріжничка дасть ся
розложити на вираженя виду :

$$\frac{Ax^n dx}{\sqrt{R}}, \text{ і } \frac{Adx}{(x-a)^m \sqrt{R}}$$

а зінтегрувавши ту ріжничку дістанемо загальне відношене поміж
тими чотирома інтегралами, виражене при помочи функцій льогаї-
їтмічних. Шукана функція льогаїтмічна буде очевидно мати вид :

$$T = A \log (P + Q\sqrt{R}) + A' \log (P' + Q'\sqrt{R}) + A^{(2)} \log (P^{(2)} + Q^{(2)}\sqrt{R}) + \\ + \dots + A^{(n)} \log (P^{(n)} + Q^{(n)}\sqrt{R})$$

де $P, P', P^{(2)}, \dots, Q, Q', Q^{(2)}, \dots$ суть цілковитими функціями x ,
а $A, A', A^{(2)}, \dots$ суть величинами постійними. З тої функції T
мож еще виділити виміриму часть яко не маючу значіня і взяти
під увагу функцію :

$$T' = A \log \left(\frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}} \right) + A' \log \left(\frac{P'+Q'\sqrt{R}}{P'-Q'\sqrt{R}} \right) + \dots$$

а вже ріжничка сего вираженя не буде зовсім заключати в собі
частий виміримих.

$$dT' = A \frac{PQdR + 2(PdQ - QdP)R}{(P^2 - Q^2R)\sqrt{R}} + A' \frac{P'Q'dR + 2(P'dQ' - Q'dP')R}{(P'^2 - Q'^2R)\sqrt{R}} + \dots \\ = S' \frac{dx}{\sqrt{R}}$$

Коли положимо :

$$A \frac{PQdR + 2(PdQ - QdP)R}{(P^2 - Q^2R)\sqrt{R}} = \frac{M}{N} \frac{dx}{\sqrt{R}}$$

то :

$$M = A \frac{2N \frac{dP}{dx} - P \frac{dN}{dx}}{Q}, \quad N = P^2 - Q^2R.$$

З сего видко, що коли $(x-a)^m$ є подільником функції N , $(x-a)^{m-1}$ буде подільником M , отже $\frac{M}{N}$ не може мати членів виду $\frac{B}{(x-a)^m}$ при $m > 1$. Дальше, коли $(x-a)$ є чинником заключеним в R , то він буде і чинником P , отже M і N будуть его мати яко чинник спільний, значить $\frac{M}{N}$ не може заключати також виражень $\frac{B}{x-a}$, наколи $(x-a)$ є чинником R . $\frac{M}{N}$ є на случай, коли $m > n+2$ і $m < n+2$, величиною постійною, а лише на случай коли $m = n+2$, може бути функцією цілковитою першого степеня, (m означає степеня функції P , а n функції Q), і на тій підставі $\frac{M}{N}$ буде мати вид:

$$\frac{M}{N} = Bx + B' + \frac{C}{x-a} + \frac{C'}{x-a'} + \frac{C''}{x-a''} + \dots$$

де $(x-a)$, $(x-a')$ не суть чинниками в R .

З сего виходить, що інтеграл $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}}$ є незведимий в ніякім случаю. Він становить незведимість особливу (transcedente particulière).

T' представить ся: (12)

$$T' = k \int \frac{dx}{\sqrt{R}} + k' \int \frac{xdx}{\sqrt{R}} + L \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} + \dots + L^{(r)} \int \frac{dx}{(x-a^{(r)})\sqrt{R}}$$

І се є найзагальнійше відношенє між нашими інтегралами.

Щоби скористати з сего рівняня, автор розв'язує кілька (пять) частинних проблемів, з котрих першій є:

А) Визначити інтеграл $\int \frac{(k+k'x)dx}{\sqrt{R}}$ через як най-

менше число інтегралів виду $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$.

Наколи $P, Q, P', Q', \dots, P^{(r)}, Q^{(r)}$ суть степенів: $m, n, m', n', \dots, m^{(r)}, n^{(r)}$, то они мають $m+n+m'+n'+\dots+m^{(r)}+n^{(r)}+r+1$ сочинників неозначених, а додавши до сего ще $A, A', \dots, A^{(r)}$, будемо мати всіх сочинників неозначених:

$$m+n+m'+n'+\dots+m^{(r)}+n^{(r)}+2r+2 = a'$$

отже :

$$A \frac{M}{N} + A' \frac{M'}{N'} + A'' \frac{M''}{N''} + \dots + A^{(r)} \frac{M^{(r)}}{N^{(r)}} \\ = k + k'x + \frac{C + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_{r-\alpha'+1} x^{r-\alpha'+1}}{D + D_1 x + D_2 x^2 + \dots + D_{r-\alpha'+1} x^{r-\alpha'+1}} = P$$

(ν є сумою степенів $N, N', \dots, N^{(r)}$, k і k' суть які небудь). А то

значить, що: Інтеграл $\int \frac{(k+k'x)dx}{\sqrt{R}}$ можна виразити через

$$\nu + \alpha' + 2 \text{ інтегралів виду } \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}.$$

В случаю частнім, іменно коли всі P будуть степеня $m = n + 2$, випадає: $\nu - \alpha' + 2 = 2$. Тоді

$$S = k + k'x + \frac{C + C'x}{D + D_1 x + D_2 x^2} = k + k'x = \frac{L}{(x-a)} + \frac{L'}{(x-a')}$$

а інтеграл сего:

$$\int \frac{(k+k'x)dx}{\sqrt{R}} = T' - L \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} - L' \int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}}.$$

А позаяк r є довільне, то при $r = 0$

$$T' = A \log \frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}}$$

а коли крім сего положимо $n = 0$, бо оно також є довільне, то $m = 2$. Положім:

$$P = f + f^{(1)}x + f^{(2)}x^2, \text{ а } Q = 1$$

дістанемо:

$$N = P^2 - Q^2R = (f + f^{(1)}x + f^{(2)}x^2)^2 - R = D + D_1x + D_2x^2$$

$$M = A \left(2N \frac{dP}{dx} - P \frac{dN}{dx} \right)$$

$$= A [2(D + D_1x + D_2x^2)(f^{(1)} + 2f^{(2)}x) - (D + D_1x)(f + f^{(1)}x + f^{(2)}x^2)] \\ = C + C_1x + C_2x^2 + C_3x^3$$

а з відси через порівнянє сочинників одержимо $C, C_1, C_2, C_3, D, D_1, D_2, f, f^{(1)}, f^{(2)}$, отже:

$$\frac{M}{N} = \frac{C + C_1x + C_2x^2 + C_3x^3}{D + D_1x + D_2x^2} = \frac{C_3}{D_2}x + \frac{C_2D_2 - C_3D_1}{D_2^2} + \frac{C' + C'_1x}{D + D_1x + D_2x^2}$$

де для скорочення положено:

$$\frac{C_1 D_2 - C_3 D}{D_2} - \frac{D_1 (C_2 D_2 - C_3 D_1)}{D_2^2} = C_1' \quad \text{а}$$

$$C - \frac{D (C_2 D_2 - C_3 D_1)}{D_2^2} = C'$$

$$\text{Возьмім } \frac{C_3}{D_3} = k' \quad \text{а} \quad \frac{C_2 D_2 - C_3 D_1}{D_2^2} = k$$

то наколи: $\frac{C' + C_1' x}{D + D_1 x + D_2 x^2}$ розібемо на:

$$\frac{L}{x-a} + \frac{L'}{x-a'} \quad \text{тоді:}$$

$$\int \frac{(k+k'x)dx}{\sqrt{R}} = -L \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} - L' \int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}} \quad (13)$$

$$+ \frac{k'}{2\sqrt{\varepsilon}} \log \left(\frac{f + \frac{\delta}{2\sqrt{\varepsilon}} x + \sqrt{\varepsilon} x^2 + \sqrt{R}}{f + \frac{\delta}{2\sqrt{\varepsilon}} x + \sqrt{\varepsilon} x^2 - \sqrt{R}} \right)$$

і то є шукане зведене.

Коли $k=0$, а $k'=1$, то взір сей перейде на:

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{R}} = (G + H\sqrt{K}) \int \frac{dx}{(x-\sqrt{K})\sqrt{R}} + (G - H\sqrt{K}) \int \frac{dx}{(x-\sqrt{K})\sqrt{R}} \quad (14)$$

$$+ \frac{1}{2\sqrt{\varepsilon}} \log \left(\frac{\frac{\beta}{\delta} \sqrt{\varepsilon} + \frac{\delta}{2\sqrt{\varepsilon}} x + \sqrt{\varepsilon} x^2 + \sqrt{R}}{\frac{\beta}{\delta} \sqrt{\varepsilon} + \frac{\delta}{2\sqrt{\varepsilon}} x + \sqrt{\varepsilon} x^2 - \sqrt{R}} \right)$$

де:

$$G = \frac{4\alpha\delta^2\varepsilon + \beta\delta^3 + \beta^2\varepsilon^2 - 4\beta\gamma\delta\varepsilon}{2(\delta^4 + 8\beta\delta\varepsilon^2 - 4\gamma\delta^2\varepsilon)}$$

$$H = \frac{\delta}{4\varepsilon} \left(\frac{\beta^2\varepsilon - \alpha\delta^2}{\varepsilon\beta^2 - \alpha\delta^2} \right), \quad K = \frac{4\varepsilon}{\delta} \left(\frac{\varepsilon\beta^2 - \alpha\delta^2}{4\gamma\delta\varepsilon - 8\beta\varepsilon^2 - \delta^3} \right)$$

На случай, коли $D_2 = 0$, рівнане (13) перейде на

$$\int \frac{(k+k'x)dx}{\sqrt{R}} = \left[\frac{k'}{3\sqrt{\varepsilon}} f - \left(\frac{k'}{3\varepsilon} - k \right) \mu \right] \int \frac{dx}{(x+\mu)\sqrt{R}}$$

$$+ \frac{k'}{2\sqrt{\varepsilon}} \log \left(\frac{f + \frac{\delta}{2\sqrt{\varepsilon}} x + \sqrt{\varepsilon} x^2 + \sqrt{R}}{f + \frac{\delta}{2\sqrt{\varepsilon}} + \sqrt{\varepsilon} x^2 + \sqrt{R}} \right)$$

$$\text{де: } f = \frac{4\varepsilon\gamma - \delta}{8\varepsilon\sqrt{\varepsilon}} \quad \text{а: } \mu = \frac{(f^2 - \alpha^2)\sqrt{\varepsilon}}{f\delta - \beta\sqrt{\varepsilon}}$$

а взір (14) представить ся:

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{R}} = \frac{1}{3\varepsilon} (\mu' - \mu) \int \frac{dx}{(x+\mu)\sqrt{R}} + \frac{1}{3\sqrt{\varepsilon}} \log \left(\frac{\frac{\mu'}{\sqrt{\varepsilon}} + \frac{\delta}{2\sqrt{\varepsilon}} x + \sqrt{\varepsilon} x^2 + \sqrt{R}}{\frac{\mu'}{\sqrt{\varepsilon}} + \frac{\delta}{2\sqrt{\varepsilon}} x + \sqrt{\varepsilon} x^2 - \sqrt{R}} \right)$$

$$\text{де: } \mu' = \frac{4\varepsilon\gamma - \delta^2}{8\varepsilon} \quad \text{а } \mu = -\frac{\delta}{2\varepsilon};$$

між сочинниками $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ заходить тоді відношене:

$$(4\varepsilon\gamma - \delta^2)^2 + 4\delta^2(4\varepsilon\gamma - \delta^2) + 32\beta\delta\varepsilon^2 - 64\alpha\varepsilon^3 = 0.$$

До зведень тих дійшли ми в той спосіб, щосьмо спровадили $\frac{M}{N}$

до виду $\frac{C+C_1x+C_2x^2+C_3x^3}{D+D_1x+D_2x^2}$ кладучи $P^2 - Q^2R = D + D_1x + D_2x^2$.

Але се можна би зробити також в иньший спосіб, приміром кладучи:

$$R = (p + qx + rx^2)(p' + q'x + x^2) \\ P = f(p' + q'x + x^2), \quad Q = 1.$$

Поступаючи анальогічно найдемо, що $\int \frac{(k+x)dx}{\sqrt{R}}$ на сей спо-

сіб звести ся не дасть, за се $\int \frac{dx}{\sqrt{R}}$ дасть ся звести до одного

лише інтеграла виду $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{R}} = -L \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} + A \log \left[\frac{f(p' + q'x + x^2) + \sqrt{R}}{f(p' + q'x + x^2) - \sqrt{R}} \right] \quad (15)$$

де:

$$L = \frac{pq' - qp' + (rq' - q)a^2}{(rq' - q)a}$$

$$A = \frac{f^2 - r}{f(rq' - q)}, \quad a = \frac{q - q'f^2}{2(f^2 - r)}$$

а f визначене в рівнанім

$$f^4(q'^2 - 4p') - f^2(2qq' - 4p - 4p'r) + q^2 - 4pr = 0.$$

Положимо в зорі (15) $r=1$, $q'=-q$, $p'=p$, то дістанемо:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(p+qx+x^2)(p-qx+x^2)}} = 2\sqrt{p} \int \frac{dx}{(x-\sqrt{p})\sqrt{(p+qx+x^2)(p-qx+x^2)}} \quad (16)$$

$$- \frac{1}{\sqrt{4p-q^2}} \log \left(\frac{\frac{q+2\sqrt{p}}{\sqrt{4p-q^2}} \sqrt{p-qx+x^2} + \sqrt{p+qx+x^2}}{\frac{q+2\sqrt{p}}{\sqrt{4p-q^2}} \sqrt{p-qx+x^2} + \sqrt{p+qx+x^2}} \right).$$

Можна ще через підставлення $P = f + f^{(1)}x + f^{(2)}x^2$ звести інтеграл

$\int \frac{dx}{\sqrt{R}}$ і на інші способи, пр. кладучи:

$$N = P^2 - R = k(x-a)^4, \quad R = \varepsilon(x-p)(x-p')(x-p'')(x-p''').$$

Взір зведення буде:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x-p)(x-p')(x-p'')(x-p''')}} = L \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{(x-p)(x-p')(x-p'')(x-p''')}} \quad (17)$$

$$+ A \log \frac{f + f'x + f''x^2 + \sqrt{(x-p)(x-p')(x-p'')(x-p''')}}{f + f'x + f''x^2 - \sqrt{(x-p)(x-p')(x-p'')(x-p''')}}.$$

де:

$$A = - \frac{1}{2\sqrt{(p+p'-2a)(p''+p'''-2a)}}$$

$$L = 2 \sqrt{\frac{(a-p)(a-p')(a-p'')(a-p''')}{[2a-(p+p')] [2a-(p''+p''')]}}$$

а коли в тім зорі положимо $p'' = -p$, $p''' = -p'$ і назовемо $(p+p')$ через q , а pp' через r , то (17) перейде на:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+qx+r)(x^2-qx+r)}} = 2\sqrt{r} \int \frac{dx}{(x-\sqrt{r})\sqrt{(x^2+qx+r)(x^2-qx+r)}} \quad (18)$$

$$- \frac{1}{(q^2-4r)} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{q^2-4r} \sqrt{(x^2+qx+r)(x^2-qx+r)}}{2r\sqrt{r}-q^2x+2\sqrt{r}x^2} \right)$$

А то є той сам взір, що (16), лише представлений в иньшій виді. Додати треба, що все можна прийняти P і R без спільного чинника, (бо через перерібку все мож дійти до таких P' і R , котрі не будуть мати спільного подільника).

Б) Найдти умовини потрібні, щоб:

$$\int \frac{x^m + k^{(m-1)} x^{m-1} + \dots + k' + k}{x^m + l^{(m-1)} x^{m-1} + \dots + l'x + l} \frac{dx}{\sqrt{R}} = A \log \frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}}$$

Спосіб переведення остане той сам.

Положим:

$$Q = e_1 + e^{(1)} x + e^{(2)} x^2 + \dots + e^{(n-1)} x^{(n-1)} + x^n$$

$$P = f + f^{(1)} x + f^{(2)} x^2 + \dots + f^{(n+1)} x^{(n+1)} + x^{n+2}$$

де n є число ціле, сповняюче услівє $2n + 4 > m$.

Най:

$$x^m + l^{(m-1)} x^{m-1} + \dots + l'x + l = (x-a)((x-a')(x-a'') \dots (x-a^{(m-1)}),$$

то щоби $\frac{M}{N}$ звести до виду:

$$\frac{x^m + k^{(m-1)} x^{m-1} + k^{(m-2)} x^{m-2} + \dots + k}{x^m + l^{(m-1)} x^{m-1} + l^{(m-2)} x^{m-2} + \dots + l} = \frac{M'}{(x-a)(x-a') \dots (x-a^{(m-1)})}$$

потреба положити:

$$N = P^2 - Q^2 R = C(x-a)^\mu (x-a')^{\mu'} (x-a'')^{\mu''} \dots (x-a^{(m-1)})^{\mu^{(m-1)}} = CS$$

$$\text{де} \quad 2n + 4 = \mu + \mu' + \mu'' + \dots + \mu^{(m-1)};$$

а то сповнимо, кладучи пр.

$$P = Fx, \quad Q = fx, \quad R = \varphi(x)$$

і дістанемо $(m-1)$ рівнянь:

$$(Fx)^2 = (fx)^2 \varphi x$$

$$\text{або:} \quad Fx = \pm fx \sqrt{\varphi x} = i fx \sqrt{\varphi x}$$

$$x = a, \quad a', \quad a'', \quad \dots \quad a^{(m-1)}. \quad (19)$$

А різничкуючи перше $(\mu-1)$ разів, друге $(\mu'-1)$ разів і т. д. дістанемо зі згляду на a рівняне виду:

$$d^p Fa = \pm d^p fa \sqrt{\varphi a} + p d^{p-1} fa d\sqrt{\varphi a} + \frac{p(p-1)}{2} d^{p-2} fa d^2 \sqrt{\varphi a} + \dots + fa d^p \sqrt{\varphi a} \quad (20)$$

$$a = a, \quad a', \quad a'', \quad \dots$$

$$\begin{aligned} \text{а кладучи:} \quad & p = 0, \quad 1, \quad 2, \quad \dots \quad \mu \\ & p = 0, \quad 1, \quad 2, \quad \dots \quad \mu' \\ & p = 0, \quad 1, \quad 2, \quad \dots \quad \mu'' \quad \text{і т. д.} \end{aligned}$$

дістанемо рівняня потрібні до визначення e , $e^{(1)}$, $e^{(2)}$, f , $f^{(1)}$, $f^{(2)}$, і т. д. Щоби найти k , k' , k'' , і A , утворім:

$$\frac{dN}{Ndx} = \frac{\mu}{x-a} + \frac{\mu'}{x-a'} + \frac{\mu''}{x-a''} + \frac{\mu'''}{x-a'''} + \dots$$

$$\frac{dN}{Ndx} = \frac{h + h^{(1)}x + h^{(2)}x^2 + h^{(3)}x^3 + \dots + h^{(m-1)}x^{m-1}}{1 + l^{(1)}x + l^{(2)}x^2 + l^{(3)}x^3 + \dots + l^{(m-1)}x^{m-1}} = \frac{t}{S}$$

а:

$$\frac{M}{N} = \frac{A \left(2 \frac{dP}{Qdx} S - \frac{PT}{Q} \right)}{S} = \frac{k + k^{(1)}x + k^{(2)}x^2 + \dots + k^{(m-1)}x^{m-1} + x^m}{S}$$

а з відси:

$$k + k^{(1)}x + k^{(2)}x^2 + \dots + k^{(m-1)}x^{m-1} + x^m = A \frac{2 \frac{dP}{dx} S - Pt}{Q};$$

для $x = a$ буде:

$$k + k^{(1)}a + k^{(2)}a^2 + k^{(3)}a^3 + \dots + a^m = -i \mu A \sqrt{\varphi} \psi(a) \quad (21)$$

де $\psi(x) = (x - a')(x - a'')(x - a''') \dots$

для $x = a$, a' , a'' , $a^{(m-1)}$.

Через се дістанемо з (21) m рівнянь на визначенє: k , $k^{(1)}$, $k^{(2)}$, $k^{(m-1)}$ при помочи A , a , a' , a'' , a^{m-1} , а на A найдемо вартість:

$$A = - \frac{1}{(\mu a + \mu' a' + \mu'' a'' + \dots) f^{(n+2)} + 2f^{(n+1)}}.$$

Коли $\mu = \mu' = \mu'' = \dots = \mu^{(m-1)} = 1$, рівняня остануть ті самі, а $m = 2n + 4$.

Возьмім $n = 0$ і щоби найти сочинники, покладім:

$$R = (x - p)(x - p')(x - p'')(x - p''')$$

а в рівнянях:

$$P = \sqrt{R + CS}, \quad S = 1 + l^{(1)}x + l^{(2)}x^2 + l^{(3)}x^3 + x^4 = \Theta x$$

положім $x = p$, p' , p'' , p''' , то на підставі (19) дістаємо чотири рівняня:

$$f + p f^{(1)} + p^2 f^{(2)} = \sqrt{C} \sqrt{\Theta p} \quad p = p, p', p'', p'''$$

а усуваючи з тих рівнянь f , $f^{(1)}$, $f^{(2)}$, дістанемо рівняне:

$$\frac{\sqrt{(p-a)(p-a')(p-a'')(p-a''')}}{(p-p')(p-p'')(p-p''')} + \frac{\sqrt{(p'-a)(p'-a')(p'-a'')(p'-a''')}}{(p'-p)(p'-p'')(p'-p''')} +$$

$$+ \frac{\sqrt{(p''-a)(p''-a')(p''-a'')(p''-a''')}}{(p''-p)(p''-p'')(p''-p''')} + \frac{\sqrt{(p'''-a)(p'''-a')(p'''-a'')(p'''-a''')}}{(p'''-p)(p'''-p'')(p'''-p''')} = 0$$

котре вказує, які відносини мусять заходити, щоби сповнилось заложенє поданє в заголовку.

Перейдїм другї частні случаї.

1) $m=2, n=0$.

Се мож сповнити кладучи :

$$\alpha) P^2 - R = C(x-a)(x-a')^3$$

$$\beta) P^2 - R = C(x-a)^2(x-a')^2$$

$\alpha)$ Наколи $P^2 - R = C(x-a)(x-a')^3$, то з рівнянь (19) і (20) вийдуть вартости на $f, f^{(1)}, f^{(2)}$, а на відношенє між a і a' дістанемо :

$$\sqrt{\varphi a} - \sqrt{\varphi a'} - \frac{1}{2}(a-a') \frac{\varphi'(a')}{\sqrt{\varphi a'}} + \frac{1}{8}(a-a')^2 \cdot \frac{2\varphi a' \varphi''(a')^2}{\varphi a' \sqrt{\varphi a'}} = 0$$

$$A = - \frac{1}{(a+3a')f^{(2)} + 2f^{(1)}}$$

$\beta)$ Коли $P^2 - R = C(x-a)^2(x-a')^2$

то підставляючи вартости за $f, f^{(1)}, f^{(2)}$ і A знадені з рівняня (20) в вираженях на k і k' дістанемо :

$$\frac{k+k'x+x^2}{(x-a)(x-a')} = 1 + \frac{2b+2b'x}{(x-a)(x-a')},$$

де :

$$b = \frac{a' \sqrt{\varphi a} + a \sqrt{\varphi a'}}{\frac{\varphi' a}{\sqrt{\varphi a}} + \frac{\varphi' a'}{\sqrt{\varphi a'}}}, \quad b' = \frac{\sqrt{\varphi a} + \sqrt{\varphi a'}}{\frac{\varphi' a}{\sqrt{\varphi a}} + \frac{\varphi' a'}{\sqrt{\varphi a'}}$$

Отже інтеграл виразить ся :

$$\int \frac{dx}{\varphi(x)} = - \int \frac{(2b+2b'x)}{(x-a)(x-a')} \frac{dx}{\sqrt{\varphi x}} + A \log \frac{P + \sqrt{\varphi x}}{P - \sqrt{\varphi x}}$$

а відношенє поміж a і a' буде :

$$a' = \frac{(pp' - p''p''')a + (p+p')p''p''' - (p''+p''')pp'}{(p+p' - p'' - p''') - pp' + p''p'''}$$

2) Для $m=1$ буде :

$$P^2 - Q^2R = C(x-a)^{2n+4}$$

$$\int \frac{x+k}{(x-a)} \frac{dx}{\sqrt{R}} = A \log \frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}}$$

k виразить ся безпосередно з рівняня (21) $k = -a - \mu A \sqrt{\varphi a}$, а величини $A, a, f, f^{(1)}, f^{(2)}, e, e^{(1)}, e^{(2)}, \dots$ і т. д. найде ся при помочи (20).

Підставивши вартість за k в повнішій інтегралі одержимо :

$$\int \frac{dx}{\sqrt{R}} - \mu A \sqrt{\varphi a} \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} = A \log \frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}}$$

В той спосіб найде ся всі інтеграли виду $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$, які мож спровадити на інтеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{R}}$ при помочи функції льогаритмічної виду $A \log \frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}}$.

З цілого сего уступу бачимо, що коли заходить рівняне

$$\int \frac{x^m + k^{(m-1)}x^{m-1} + k^{(m-2)}x^{m-2} + \dots + k^{(1)}x + k}{(x-a)(x-a')(x-a'') \dots (x-a^{(m-1)})} \frac{dx}{\sqrt{R}} = A \log \frac{P+R\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}}$$

то поміж сочинниками $a, a', a'' \dots a^{(m-1)}, k, k' \dots k^{(m-1)}$ буде істнувати $(m+1)$ рівнянь, значить буде мож $m+1$ з поміж тих величин вибрати довільно і при їх помочи означити прочі. Звідси виходить, що можна положити :

$$\frac{x^m + k^{(m-1)}x^{m-1} + k^{(m-2)}x^{m-2} + \dots + k^{(1)}x + k}{(x-a)(x-a') \dots (x-a^{(m-1)})} =$$

$$= \frac{x^m + k_1^{(n-1)}x^{n-1} + \dots + k_1^{(1)}x + k_1}{(x-a)(x-a') \dots (x-a^{(n-1)})} + \frac{L}{x-c} + \frac{L'}{x-c'} + \dots + \frac{L^{(n-1)}}{x-c^{(n-1)}}$$

де $k_1^{(n-1)}, k_1^{(n-2)}, \dots, k_1^{(1)}, k_1, a, a', a'', \dots, a^{(n-1)}$ суть які-небудь.

Отже інтеграл

$$\int \frac{x^n + k_1^{(n-1)}x^{n-1} + \dots + k_1^{(1)}x + k_1}{(x-a)(x-a') \dots (x-a^{(n-1)})} \frac{dx}{\sqrt{R}}$$

мож виразити через n інтегралів виду $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$. Так само видно, що можна інтеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{R}}$ виразити че-

рез n інтегралів виду $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$, з поміж котрих $(n-1)$ є довільних зі згляду на a .

В) Найдти всі інтеграли виду $\int \frac{(x+k)dx}{\sqrt{R}}$, що дадуться виразити при помочи функції $A \log \left(\frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}} \right)$.

$$\text{Позаяк} \quad \int \frac{(x-k)dx}{\sqrt{R}} = A \log \frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}}$$

$$\text{то різничка} \quad x+k = \frac{M}{N}$$

а з сего виходить, що $N = c = \text{const}$.

З взорів:

$$M = \frac{A \left(2N \frac{dP}{dx} - P \frac{dN}{dx} \right)}{Q}$$

$$N = P^2 - Q^2 R \quad \text{дістанемо:}$$

$$c(x+k) = 2Ac \frac{dP}{dx}, \quad c = P^2 - Q^2 R.$$

З рівнянь тих мож винайти k і A , наколи P і Q суть відомі. Принявши $c=1$, положім в наших рівнянях:

$$P = f + f^{(1)}x + f^{(2)}x^2 + \dots + f^{(n+2)}x^{n+2}$$

$$Q = e + e^{(1)}x + e^{(2)}x^2 + \dots + e^{(n)}x^n$$

то дістанемо на A і k вартости:

$$A = \frac{e^{(n)}}{(2n+4)f^{(n+2)}}, \quad k = \frac{f^{(1)}e^{(n)}}{(n+2)e f^{(n+2)}}$$

Що до вартостей P і Q , то їх дістанемо з рівняня:

$$P^2 - Q^2 R = 1.$$

Іменно, коли за P і Q підставимо повнєші вираженя, дістанемо:

$$(f + f^{(1)}x + f^{(2)}x^2 + \dots + f^{(n+2)}x^{n+2})^2 - (e + e^{(1)}x + e^{(2)}x^2 + \dots + e^{(n)}x^n)^2 (\alpha + \beta x + \dots + \varepsilon x^4) = 1. \quad (22)$$

Розвинувши се і порівнявши сочинники, дістанемо $(2n+5)$ рівнянь на означене $(2n+4)$ сочинників: $f, f^{(1)}, f^{(2)}, \dots, f^{(2n+2)}, e, e^{(1)}, e^{(2)}, \dots, e^{(n)}$, значить ся, що понад се дістанемо ще відношенє поміж $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$. Сочинник при x^{2n} буде: $f^{(n+2)} - \varepsilon e^{(n)} = 0$, а через се вартости на A і k перейдуть на:

$$A = \frac{1}{(2n+4)\sqrt{\varepsilon}}, \quad k = \frac{1}{(n+2)\sqrt{\varepsilon}} \frac{f^{(1)}}{e}. \quad (23)$$

Є ту лиш негодність рахунку, а то та, що рівняня, які вийдуть з порівняня сочинників в (22), не суть лінійні. Але рівняня ті мож заступити системою рівнянь лінійних в слідуючий спосіб: Коли в рівняню:

$$P^2 - Q^2 R = 1$$

місто x положимо $\frac{1}{y}$, одержимо рівняне виду:

$$(Fy)^2 - (fy)^2 \varphi(y) = y^{2n+4}$$

котре для $y = 0$ перейде на:

$$Fy = fy \sqrt{\varphi y}$$

а в нїм:

$$F(y) = fy^{2n+2} + f^{(1)}y^{n+1} + \dots + f^{(n+2)}$$

$$f(y) = ey^n + e^{(1)}y^{n-1} + \dots + e^{(n)}$$

$$\varphi(y) = \alpha y^4 + \beta y^3 + \gamma y^2 + \delta y + \varepsilon$$

Зріжничкувавши рівняне $Fy = fy \sqrt{\varphi y}$ $2n+3$ разів дістанемо дл $y = 0$ по підставленю вартостей:

$$f^{(n+2)} = c e^{(n)}$$

$$f^{(n+1)} = c e^{(n-1)} + c^{(1)} e^{(n)}$$

$$f^{(n)} = c e^{(n-2)} + c^{(1)} e^{(n-1)} + \frac{1}{2} c^{(2)} e^{(n)}$$

⋮
⋮

(24)

$$f^{(2)} = c e + c^{(1)} e^{(1)} + \frac{c^{(2)}}{2} e^{(2)} + \frac{c^{(3)}}{2.3} e^{(3)} + \dots + \frac{c^{(n)}}{1.2 \dots n} e^{(n)}$$

$$f^{(1)} = c^{(1)} e + \frac{c^{(2)}}{2} e^{(1)} + \frac{c^{(3)}}{2.3} e^{(2)} + \dots + \frac{c^{(n+1)}}{1.2.3 \dots (n+1)} e^{(n+1)}$$

$$f = \frac{c^{(2)}}{2} e + \frac{c^{(3)}}{2.3} e^{(2)} + \frac{c^{(4)}}{2.3.4} e^{(3)} + \dots + \frac{c^{(n+2)}}{1.2.3 \dots (n+3)} e^{(n+1)}$$

$$0 = \frac{c^{(3)}}{2.3} e + \frac{c^{(4)}}{2.3.4} e^{(1)} + \frac{c^{(5)}}{2.3.4.5} e^{(2)} + \dots + \frac{c^{(n+3)}}{1.2.3 \dots (n+3)} e^{(n)}$$

$$0 = \frac{c^{(4)}}{2.3.4} e + \frac{c^{(5)}}{2.3.4.5} e^{(1)} + \dots + \frac{c^{(n+4)}}{1.2.3 \dots (n+4)} e^{(n)}$$

⋮

$$0 = \frac{c^{(n+3)}}{2.3 \dots (n+3)} e + \frac{c^{(n+4)}}{2.3 \dots (n+4)} e^{(1)} + \dots + \frac{c^{(2n+3)}}{1.2.3 \dots (2n+3)} e^{(n)}$$

де в сочинники $c, c^{(1)}, c^{(2)}, \dots$ і т. д. вийшли кромі c ще $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$. З $n+1$ послідних з поміж тих рівнянь виразимо $e^{(1)}, e^{(2)}, \dots, e^{(n)}$

при помочи e , а крім сего дістанемо відношене поміж $c^{(3)}, c^{(4)}, \dots$ і т. д. Перших $(n+2)$ рівнянь дасть знова $f, f^{(1)}, f^{(2)}, \dots, f^{(n+2)}$ виражені при помочи e . Само e є довільне і в вислідї не буде приходити. Коли положимо $k=0$, то і $f^{(1)}=0$, а з відси дістанемо ще друге відношене поміж $c^{(1)}, c^{(2)}, \dots$ і т. д. і тоді побачимо що:

$$\text{Інтеграл} \quad \int \frac{xdx}{\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + \epsilon x^4}}$$

дасть ся виразити при помочи логаритмів все, наколи поміж $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$, заходять два відношеня, які дістанемо, коли вилімінуємо з $n+1$ з поміж (20) і з $f^{(1)}=0$ величини $e, e^{(1)}, e^{(2)}, \dots, e^{(n)}$. (Ограничене $k=0$ не впливає на загальність проблему, бо вистане в вислідї положити $x=y+k$, а дістанемо той сам інтеграл, як колиб не були закладали $k=0$).

І так пр. для $n=0$ того відношене поміж $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ представить ся:

$$\gamma = \frac{2\epsilon\beta}{\delta} + \frac{\delta^2}{4\epsilon}.$$

Пр.: $n=1$;

можна положити $\epsilon=1, \beta=-\alpha$, тоді з рівнянь (20) вийде: $\delta=2, \gamma=3, e$ (яко довільне) возьмемо $=2$, то дальше вийде: $e^{(1)}=1, f^{(3)}=1, f^{(2)}=3, f^{(1)}=0, f=-\frac{\alpha}{2}-2, k=0, A=\frac{1}{6}$

отже:

$$\int \frac{xdx}{\sqrt{x^4+2x^3-3x^2-\alpha x+\alpha}} = \frac{1}{6} \log \left(\frac{x^3+3x^2-2-\frac{\alpha}{2}+(x+2)\sqrt{x^4+2x^3-3x^2-\alpha x+\alpha}}{x^3+3x^2-2-\frac{\alpha}{2}-(x-2)\sqrt{x^4+2x^3-3x^2-\alpha x+\alpha}} \right)$$

Рівняне: $P^2-1=Q^2R$ можна переробити:

$$(P+1)(P-1)=Q^2R=P'^2Q'^2R''.$$

Положим ту:

$$Q=P'Q', \quad R=R'R'',$$

то дістанемо:

$$P+1=P'^2R'$$

$$P-1=P'^2R''$$

а з відси:

$$2=P'^2R'-Q'^2R'' \quad (25)$$

А то є простійше рівнянє, чим $P^2 - Q^2R = 1$. Пожиток з сего рівняннє побачимо.

Положим:

$$R' = x^2 + 2qx + p, \quad R'' = x^2 + 2q'x + p'$$

а P' і Q' возьмим постійні, то дістанемо через порівнянє сочинників в (25) по підставленю вартостей за R' і R''

$$P = \frac{2x^2 + 4qx + p + p'}{p - p'}, \quad Q = \frac{2}{p - p'}, \quad k = q, \quad A = \frac{1}{4}.$$

А інтеграл виразить ся:

$$\int \frac{(x+q)dx}{\sqrt{(x^2+2qx+p)(x^2+2q'x+p')}} = \frac{1}{4} \log \left(\frac{2x^2+4qx+p+p'+2\sqrt{R}}{2x^2+4qx+p+p'-2\sqrt{R}} \right)$$

Є ще і другий спосіб розв'язаннє рівняннє:

$$P^2 - Q^2R = 1 \tag{26}$$

а є він слідуєчий:

$$\text{Поставмо:} \quad R = r^2 + s,$$

де r є степєня другого, а s першого, то:

$$P^2 - Q^2r - Q^2s = 1.$$

Перший сочинник в P^2 і в Q^2r мусить бути той сам, отже можна положити:

$$P = Qr + Q_1$$

де Q_1 буде степєня $n-1$, наколи Q є степєня n , а наше рівнянє перейде на:

$$Q_1^2 + 2QQ_1 - Q^2s = 1.$$

А коли v є найбільшою функцією цілковитою, що містить ся в $\frac{r}{s}$, тоді:

$$r = sv + u,$$

де u є постійне.

Через се дістанемо:

$$Q_1^2 + 2QQ_1u + Qs(2vQ_1 - Q) = 1$$

або кладучи:

$$Q = 2vQ_1 + Q_2$$

$$s_1 = 1 + 4uv, \quad r_1 = r - 2u$$

дістанемо місто рівняннє (26):

$$s_1 Q_1^2 - 2r_1 Q_1 Q_2 - s Q_2^2 = 0$$

А стосуючи до сего рівняня на той сам лад і дальші підста-
влена виду :

$$s_m = s_{m-2} + 4u_{m-1}v_{m-1} \quad (27)$$

$$r_m = r_{m-1} - 2u_{m-1} \quad (28)$$

$$r_m = s_m v_m + u_m \quad (29)$$

$$Q_m = 2v_m Q_{m+1} + Q_{m+2}$$

де Q_{m+2} є степеия $n - m - 2$, дійдемо до рівняня :

$$s_n Q_n^2 = (-1)^{n+1}$$

де Q_n буде величиною постійною, а тим самим і s_n буде постійне.
А то значить, що коли $P^2 - Q^2 R = 1$ дасть ся розвязати при по-
мочи функцій цілковитих, тоді одна з поміж величин :

$$c, s_1, s_2, s_3, \dots$$

є постійною і на відворот. А коли приміром $s_n = const$, тоді P є
степеия $n + 2$, а Q степеия n . Отже треба по черзі класти $s, s_1,$
 $s_2, \dots = const$, щоби найти всі вартости R .

З рівнянь (27), (28), (29), виходять слідуючі прикмети величин
 r, s, u, v для $s_n = const$:

$$r_{n-k} = r_k, s_{n-k} = s_{k-1} u^{+1}, v_{n-k} = v_{k-1} u^{+1}, u_{n-k} = -u_{k-1}.$$

Для n непаристого $= 2\alpha + 1$ дістанемо кладучи $k = \alpha + 1$:

$$u_\alpha = 0,$$

а для n паристого $= 2\alpha$ дістанемо :

$$u_{\alpha-1} + u_\alpha = 0.$$

То значить, що коли $P^2 - Q^2 R = 1$ дасть ся розвязати, а P
є степеия непаристого, тоді $u_\alpha = 0$, а коли P є степеия парис-
того, тоді $u_{\alpha-1} + u_\alpha = 0$ і на відворот: $u_\alpha = 0$ в разі непари-
стого степеия P , а $u_{\alpha-1} + u_\alpha = 0$ в разі P паристого суть умови-
нами потрібними і достаточними до розвязаня рівняня $P^2 - Q^2 R = 1$.

З взорів перетворюючих (трансформаційних)

$$Q_m = 2v_m Q_{m+1} + Q_{m+2}$$

$$Q = 2vQ_1 + Q_2, \quad P = rQ + Q_1$$

одержимо $\frac{P}{Q}$ в виді дроба тяглого :

$$\frac{P}{Q} = r + \frac{1}{2v} + \frac{1}{2v_1} + \frac{1}{2v_2} + \dots + \frac{1}{2v_{n-2}} + \frac{1}{2v_{n-1}}$$

а звиваючи се на дроб звичайний одержимо F і Q .

\sqrt{R} дістанемо кладучи в $\frac{P}{Q} = \sqrt{R}$ $n = \infty$

$$\sqrt{R} = r + \frac{1}{2v} + \frac{1}{2v_1} + \frac{1}{2v_2} + \dots \text{ininf.}$$

На случай коли $P^2 - Q^2R = 1$ дасть ся розвязати, дроб сей буде періодичний.

Щоби означити величини v_m , u_m , s_m і r_m для всякої вартости m , положім:

$$r_m = x^2 + ax + b_m, \quad s_m = c_m + p_m x, \quad v_m = (g_m + x) \frac{1}{p_m}.$$

Коли ті вартости підставимо в (27), (28), (29), дістанемо через порівняне сочинників рівняня, з котрих поступенно найдемо c_m , p_m , b_m , g_m , u_m . — Так само мож ті величини дістати, зіставляючи названі рівняня з рівнянем:

$$(c_{m-1} + p_{m-1}x)(c_m + p_mx) + (x^2 + ax + b_m)^2 = (x^2 + ax + b)^2 + c + px.$$

Тут дістанемо ще відношеня:

$$c_{m-1}c_m = c + b^2 - b_m^2, \quad p_{m-1}p_m = 2(b - b_m) = 2q_m$$

де

$$(b - b_m) = q_m.$$

$$c_{m-1}p_m + c_m p_{m-1} = p + 2a(b - b_m)$$

а з відсеи по перерібіці:

$$q_m = \frac{\frac{1}{2}p^2 + (ap - 2c)q_{m-1} - q_{m-2}q_{m-1}^2}{q_{m-1}^2}$$

$$\frac{c_m}{p_m} = \frac{c + q_m q_{m-1}}{p}, \quad q_m = a - \frac{c_m}{p_m}, \quad p_m = \frac{2q_m}{2q_{m-1}} p_{m-2}$$

маємо:

$$q_m = b - b_m,$$

отже:

$$q = b - b = 0, \quad q_1 = b - b_1$$

з відсеи:

$$b_m = -b_{m-1} + 2 \frac{c_{m-1}}{p_{m-1}} \left(a - \frac{c_{m-1}}{p_{m-1}} \right)$$

а для:

$$m = 1 \quad b_1 = -b + 2 \frac{c}{p} \left(a - \frac{c}{p} \right)$$

$$q_1 = 2 \frac{bp^2 - ap + c^2}{p^2}$$

Застосуємо се до інтеграла:

$$\int \frac{(x+k)dx}{\sqrt{(x^2+ax+b)^2+cx+px}}$$

Для упрощення можна положити $c = 0$ і будемо мати:

$$\int \frac{(x+k)dx}{\sqrt{(x^2+ax+b)^2+px}} = \frac{1}{2n+4} \log \left(\frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}} \right)$$

а узглядивши $P^2 - Q^2R = 1$

$$\int \frac{(x+k)dx}{\sqrt{(x^2+ax+b)^2+px}} = \frac{1}{n+2} \log (P + Q\sqrt{R})$$

Щоби се рівнянє було можливе, потреба перше всего, щоби:

$$P^2 - Q^2R = 1$$

дало ся розв'язати. Се станесь, наколи $s_n = const$, а що $s_n = c_n + p_n x$, проте мусить бути:

$$p_n = 0.$$

Коли та умовина $p_n = 0$ буде сповнена, то все буде мож визначити k так, що $\int \frac{(x+k)dx}{\sqrt{(x^2+ax+b)^2+px}}$ буде рівне $\frac{1}{n+2} \log (P + Q\sqrt{R})$.

Вартість k мож буде винайти, так як шукало ся єї повисше:

$k = \frac{1}{n+2} a + \frac{f^{(1)}}{e}$. Ту того k буде мати вартість:

$$k = \frac{1}{n+2} a + \frac{1}{n+2} \left(\frac{c_1}{p_1} + \frac{c_2}{p_2} + \dots + \frac{c_{n-2}}{p_{n-2}} \right)$$

Позаяк умовина $p_n = 0$ є рівноважна з иньшою, іменно $q_n = 0$ або $q_{n-k} = q_{k-1}$, то збираючи все то разом дістанемо слідуєчє правило, щоби найти всі інтеграли виду:

$$\int \frac{(x+k)dx}{\sqrt{(x^2+ax+b)^2+px+c}}$$

які дадуть ся представити функцією логаритмічною:

$$2A \log [P+Q\sqrt{(x^2+ax+b)^2+px+c}]$$

іменно:

Обчислює ся всі величини q_2, q_3, q_4, \dots після взора:

$$q_m = \frac{\frac{1}{2} p^2 + (ap - 2c) q_{m-1} - q_{m-2} q_{m-1}^2}{q_{m-1}^2}$$

закладаючи:

$$q = 0, \quad q_1 = 2 \frac{bp^2 - asp + c^2}{p^2}$$

Відтак кладе ся по черзі:

$$q_1 = 0, \quad q_2 = 0, \quad q_3 = 0, \dots \quad q_n = 0$$

або, що на одно вийде:

$$q_{n-k} = q_{k-1}.$$

Тоді всі вартости, які R може мати, одержимо позбуваючись з тих рівнянь і рівняня $R = 0$ одної з поміж a, p, b, c . Найшовши R найдемо k :

$$k = \frac{1}{n+2} a + \frac{1}{n+2} \left(\frac{c}{p} + \frac{c_1}{p_1} + \dots + \frac{c_{n-1}}{p_{n-1}} \right)$$

де:

$$\frac{c_m}{p_m} = \frac{c + q_m q_{m-1}}{p}.$$

Дальше $\frac{P}{Q}$ представить ся:

$$\frac{P}{Q} = x^2 + ax + b + \frac{1}{x+g} + \frac{1}{p} + \frac{1}{x+g_1} + \frac{1}{p_1} + \frac{1}{x+g_2} + \dots + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{x+g_{n-1}} + \frac{1}{p_{n-1}}$$

де:

$$g_m = a - \frac{c + q_m q_{m-1}}{p}.$$

А з відси дістанемо P і Q , коли сей дроб тяглий замінимо на дроб звичайний, памятаючи що $q_{n-k} = q_{k-1}$. Найшовши се маємо наконєць

$$\int \frac{(x+k)dx}{\sqrt{(x^2+ax+b)^2+c+px}} = \frac{1}{n+2} \log [P+Q\sqrt{(x^2+ax+b)^2+c+px}]$$

Г) Найти всі інтеграли виду $\int \frac{x+k}{x+l} \frac{dx}{\sqrt{R}}$, які дадут ся виразити через функцію логаритмічну

$A \log \left(\frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}} \right)$. Єсть се вправді частний случай заключений в проблемі (Б), та для его ваги в теорії функцій еліптичних розв'яземо его окремо при помочи проблему попередного.

Вийдемо з рівняня:

$$\int \frac{(y+k')dy}{\sqrt{R'}} = A' \log \left(\frac{P'+Q'\sqrt{R'}}{P'-Q'\sqrt{R'}} \right)$$

і коли в нїм за y підставимо $\frac{1}{x+1}$, дістанемо

$$-k' \int \frac{(x+k)dx}{(x+1)\sqrt{R}} = A' \log \left(\frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}} \right)$$

де $k' = \frac{1}{k-1}$, а P, Q, R означають вартости, на які перейде $P', Q',$

R' по підставленю $y = \frac{1}{x+1}$.

Варгість на l дістанемо з порівняня сочинників в рівнянях:

$$R = (1 + (x+1)a + (x+1)^2 b)^2 + p(x+1)^3 + e(x+1)^4$$

$$R = (b^2 + c)(x^4 + \delta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha)$$

іменно l виразить ся при помочи α, β, γ і δ , а наш інтеграл представить ся в видї:

$$\int \frac{(x+k)}{(x+1)\sqrt{(x^4 + \delta x^3 + \gamma x^2 + \beta x + \alpha)}} = A \sqrt{b^2+c} \log \frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}}$$

де: $A = -\frac{A'}{k'}$

а звідси:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{R}} = (k-1) \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{R}} = A \sqrt{b^2+c} \log \frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}}$$

або:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{R}} = \frac{1}{1-k} \int \frac{dx}{\sqrt{R}} - \frac{A \sqrt{b^2+c}}{1-k} \log \left(\frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}} \right)$$

І в той спосіб дістанемо всі інтеграли виду

$$\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$$

які дадуться виразити через інтеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{R}}$ і функцію логаритмічну $A \log \left(\frac{P+Q\sqrt{R}}{P-Q\sqrt{R}} \right)$.

Д) Відношеня поміж інтегралами виду:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{R}}, \int \frac{xdx}{\sqrt{R}}, \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}}, \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}.$$

Загально неможливо є виразити інтеграл $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$ через інтеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{R}}$, $\int \frac{xdx}{\sqrt{R}}$, $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{R}}$. Але в границях, іменно для таких x , котрі дають $R=0$, все мож інтеграл $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$ виразити через тамті інтегралі.

І так, коли інтеграл:

$$\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$$

зріжничкуємо зі згляду на a і $\int \frac{dx}{(x-a)^2\sqrt{R}}$ зведемо на інтеграл $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}}$, дістанемо узглядняючи таке $x = r$, що для него $R = f(x) = 0$, таке рівняне:

$$\begin{aligned} & \sqrt{fa} \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{fx}} - \sqrt{fx} \int \frac{da}{(x-a)\sqrt{fa}} = \\ & = \int \frac{da}{\sqrt{fa}} \int \frac{(\frac{1}{2} \delta x + \epsilon x^2) dx}{\sqrt{fx}} - \int \frac{dx}{\sqrt{fx}} \int \frac{(\frac{1}{2} \delta a + \epsilon a^2) da}{\sqrt{fa}} \end{aligned}$$

Маємо в той спосіб різницю двох інтегралів $\sqrt{fa} \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{fx}}$ і $\sqrt{fx} \int \frac{da}{(a-x)\sqrt{fa}}$ виражену через інтегралі виду:

$$\int \frac{dy}{\sqrt{fy}} \text{ i } \int \frac{(\frac{1}{2} dy + \epsilon y^2) dx}{\sqrt{fy}}$$

Наколи інтеграл $\int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{fx}}$ возьмо в границях від $x = r$ до $x = r_1$, де r_1 також є вартостію, що сповняє $fx = 0$, дістаємо:

$$\begin{aligned} & \sqrt{fa} \int_r^{r_1} \frac{dx}{(x-a)\sqrt{fx}} = \\ & = \int_r \frac{da}{\sqrt{fa}} \int_r^{r_1} \frac{(\frac{1}{2} \delta x + \epsilon x^2) dx}{\sqrt{fx}} - \int_r^{r_1} \frac{dx}{\sqrt{fx}} \int_r \frac{(\frac{1}{2} \delta \alpha + \epsilon \alpha^2) da}{\sqrt{fa}} \end{aligned}$$

Взір сей має важне значіне в теорії функцій еліптичних.

Можна найти еще загальнійше відношенє межи інтегралами означеними в слідующий спосіб:

Най s означає якунебудь функцію логаритмічну виду:

$$A \log \left(\frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}} \right) + A' \log \left(\frac{P' + Q'\sqrt{R'}}{P' - Q'\sqrt{R'}} \right) + \dots$$

то:

$$ds = \frac{dx}{\sqrt{R}} \left(B + Cx + \frac{L}{x-a} + \frac{L'}{x-a'} + \dots \right)$$

а з відти:

$$s = \int \left(\frac{B + Cx}{\sqrt{R}} \right) dx + L \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{R}} + L' \int \frac{dx}{(x-a')\sqrt{R}} + \dots$$

а інтегруючи від $x = r$ до $x = r_1$ одержимо:

$$\begin{aligned} s' - s &= \int_r^{r_1} \frac{(B + Cx) dx}{\sqrt{R}} \\ &- \int_r^{r_1} \frac{dx}{\sqrt{fx}} \left[\frac{L}{\sqrt{fx}} \int_r \frac{(\frac{1}{2} \delta \alpha + \epsilon \alpha^2) da}{\sqrt{fa}} + \frac{L'}{\sqrt{fa'}} \int_r \frac{(\frac{1}{2} \delta \alpha' + \epsilon \alpha'^2)}{\sqrt{fa'}} + \dots \right] \\ &+ \int_r^{r_1} \frac{(\frac{1}{2} \delta x + \epsilon x^2) dx}{\sqrt{fx}} \left[\frac{L}{\sqrt{fa}} \int_r \frac{da}{\sqrt{fa}} + \frac{L'}{\sqrt{fa'}} \int_r \frac{da'}{\sqrt{fa'}} + \dots \right] \end{aligned}$$

Рівнянє се дає відношенє поміж системою інтегралів виду :

$$\int \frac{dy}{\sqrt{fy}}, \int \frac{y dy}{\sqrt{fy}}, \int \frac{y^2 dy}{\sqrt{fy}}.$$

Крімє до тепер виведених відношенєв поміж функціями переступними, випроваджує автор такіж :

2. Відношенє для частної класи функцій переступних. (Oeuvres compl. II. p. 54).

І так, коли y є функцією x ($y = \psi x$) сповнюючою рівнянє :

$$y f x + \varphi x \frac{dy}{dx} = 0,$$

тоді між функціями тими заходить буде відношенє :

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\psi a} \int \frac{\psi x dx}{x - a} - \psi x \varphi x \int \frac{da}{(a - x) \varphi a \psi a} = \\ & = \sum \left((n + 1) \alpha_{m+n+2} - \beta_{m+n+1} \right) \int \frac{a^m da}{\varphi a \psi a} \int x^n \psi x dx \end{aligned}$$

де α і β суть сочинниками належачими до :

$$\varphi x = \alpha + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3 + \dots$$

$$f x = \beta + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3 + \dots$$

Причїм треба зазначити, що інтеграли зі згляду на x належить брати від тої вартости x , яка зводить до зєра функцію ψx . φx , а зі згляду на a від тої вартости a , яка зводить до зєра функцію

$$\frac{1}{\psi a}.$$

Наколи $\psi x = \frac{1}{\sqrt{\varphi x}}$, тоді повисше відношенє переходить на :

$$\begin{aligned} & \sqrt{\varphi a} \int \frac{dx}{(x - a) \sqrt{\varphi x}} - \sqrt{\varphi x} \int \frac{da}{(a - x) \sqrt{\varphi a}} = \\ & = \sum \frac{1}{2} (n - m) \alpha_{m+n+2} \int \frac{x^n dx}{\sqrt{\varphi x}} \int \frac{a^m da}{\sqrt{\varphi a}} \end{aligned}$$

а для відомого нам вже виду функції φx :

$$\varphi x = (1 - x^2)(1 - c^2 x^2)$$

дістанемо відношене:

$$\begin{aligned} & \sqrt{(1-a^2)(1-c^2a^2)} \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{(1-x^2)(1-c^2x^2)}} - \\ & - \sqrt{(1-x^2)(1-c^2x^2)} \int \frac{da}{(a-x)\sqrt{(1-a^2)(1-c^2a^2)}} \\ & = c^2 \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-c^2x^2)}} \int \frac{da}{\sqrt{(1-a^2)(1-a^2c^2)}} - \\ & - c^2 \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-c^2x^2)}} \cdot \int \frac{a^2 da}{\sqrt{(1-a^2)(1-c^2a^2)}} \end{aligned}$$

котре служить як точка вихідна до випrowadжування прикмет функцій еліптичних. — Єсть се тверджене Абеля найбільше основне в цілій теорії інтегралів альгебраїчних.

3. Як виразити суму функцій переступних $\int f(yx) dx$, де y є функцією x , через означене число функцій того самого виду, показує Абель в уступі під заголовком: **Порівнане функцій переступних.** (Oeuvres compl. II. p. 66).

Коли y є функцією альгебраїчною, означеною рівнянем:

$$0 = a + \alpha_1 y + \alpha_2 y^2 + \dots + \alpha_m y^m \quad (1)$$

де a суть функціями цілковитими x :

а так само:

$$0 = q + q_1 y + q_2 y^2 + \dots + q_{m-1} y^{m-1} \quad (2)$$

де q суть функціями цілковитими x і якогось числа інших змінних a, a_1, a_2, \dots , де ті a суть сочинниками при різних степенях x в функціях q, q_1, q_2, \dots . З обох тих рівнянь можна y виразити вимірно при помочи x, a, a_1, a_2, \dots . Нехай r буде тою функцією, значить $y = r$, то підставивши ту вартість за y в одно з обох рівнянь даних, дістанемо:

$$s = 0$$

де s є функцією цілковитою x, a, a_1, a_2, \dots .

Зріжничкувавши его і помноживши через $f(yx) = f(rx)$, дістанемо:

$$f(yx) dx = \varphi(x) da + \varphi_1(x) da_1 + \varphi_2(x) da_2 + \dots \quad (3)$$

де $\varphi(x), \varphi_1(x), \dots$ суть функціями вимірними x, a, a_1, a_2, \dots .

Наколи $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ суть коріннями рівняня $s = 0$, то підставивши їх по черзі в послідне рівняне, дістанемо суму:

$$f(y_1 x_1) dx_1 + f(y_2 x_2) dx_2 + \dots + f(y_n x_n) dx_n = R da + R_1 da_1 + \dots$$

де R, R_1, R_2 , суть функціями вимірними а а₁ а₂ виду:

$$R_m = \varphi_m(x_n) + \varphi_m(x_{n-1}) + \dots + \varphi_m(x_2) + \varphi_m(x_1).$$

Позаяк ліва сторона повисшого рівняня ріжничкового є цілко-витою ріжничкою, то і права сторона також мусить дати ся з'інте-грувати:

$$\int R da + \int R_1 da_1 + \int R_2 da_2 + \dots = \varrho, \text{ де } \varrho \text{ є функцією альге-браїчною і льогаритмічною величин } a, a_1, a_2, \dots.$$

Назвавши ще $\int f(yx)dx$ через $\psi(x)$

$$\text{дістанемо: } \psi(x_1) + \psi(x_2) + \psi(x_3) + \dots + \psi(x_n) = C + \varrho. \quad (4)$$

При помочи сего рівняня можна виразити суму якогонебудь числа функцій ψx через означене число функцій того самого виду.

Величини $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ суть функціями змінних неза-висимих а, а₁, а₂, Ясною річею є, що закладаючи число тих змінних рівне μ , мож уважати число μ з поміж величин x_1, x_2, \dots, x_n яко независимі, а прочі $n - \mu$ яко їх функції. Функції ті мож вишукати.

Положим в рівняню (4) $n = \mu + \nu$, а $x_{\mu+1} = c_1$, $x_{\mu+2} = c_2, \dots, x_n = c_\nu$, то оно перейде на:

$$\psi(x_1) + \psi(x_2) + \dots + \psi(x_\mu) = C + \varrho$$

де x_1, x_2, \dots, x_μ суть звязані між собою рівнянями:

$$\Theta(x_1) = 0, \quad \Theta(x_2) = 0, \quad \dots, \quad \Theta(x_\mu) = 0$$

$$\Theta(c_1) = 0, \quad \Theta(c_2) = 0, \quad \dots, \quad \Theta(c_\nu) = 0 \quad (5)$$

Колиж тепер покладемо $x_1 = x_1', x_2 = x_2', \dots, x_\nu = x_\nu'$

а: $x'_{\nu+1} = \beta_1, x'_{\nu+2} = \beta_2, \dots, x'_\mu = \beta_{\mu-\nu}$,

дістанемо: $C = -\varrho' + \psi(x_1') + \psi(x_2') + \dots + \psi(x'_\nu)$

а:

$$\psi(x_1) + \psi(x_2) + \dots + \psi(x_\mu) = \varrho - \varrho' + \psi(x_1') + \psi(x_2') + \dots + \psi(x'_\nu),$$

де $x_1', x_2', \dots, x'_\nu$ суть означені рівнянями:

$$\Theta(x_1') = 0, \quad \Theta(x_2') = 0, \quad \dots, \quad \Theta(x'_\nu) = 0$$

$$\Theta(\beta_1) = 0, \quad \Theta(\beta_2) = 0, \quad \dots, \quad \Theta(\beta_{\mu-\nu}) = 0$$

$$\Theta(c_1) = 0, \quad \Theta(c_2) = 0, \quad \dots, \quad \Theta(c_\nu) = 0 \quad (6)$$

То коли s означимо через $\Theta_1(x)$, то буде також

$$\Theta_1(x'z) = 0, \quad \Theta_1(\beta x) = 0, \quad \Theta_1(c_x) = 0,$$

позаяк $a, a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1}$ суть визначені двома послідними рядами рівнянь (6).

$$\begin{aligned} \text{Отже буде: } \Theta_1(x) &= (x-x_1')(x-x_2') \dots (x-x_{\nu}') \\ &\cdot (x-\beta_1)(x-\beta_2) \dots (x-\beta_{\mu-\nu}) \\ &\cdot (x-c_1)(x-c_2) \dots (x-c_{\nu}) \end{aligned}$$

а ділячи рівняне $\Theta_1(x) = 0$ через добуток:

$$(x-\beta_1)(x-\beta_2) \dots (x-\beta_{\mu-\nu})(x-c_1)(x-c_2) \dots (x-c_{\nu})$$

дістанемо рівняне степеня ν , котрого корені будуть величннами:

$$x_1', x_2', \dots, x_{\nu}'.$$

А коли так визначені суть $x_1', x_2', \dots, x_{\nu}'$, яко функції c_1, c_2, \dots, c_{ν} то можна їх уважати яко змінні а визначені через (5). В той спосіб величн x_1, x_2, \dots, x_{μ} суть независимі, а $x_1', x_2', \dots, x_{\mu}'$ стають функціями тих змінних.

V. Прочі розвідки Абеля належать до різних ділів математики, а вимінити з них належить слїдуочі:

1. Про функцію переступну $\sum\left(\frac{1}{x}\right)$. (Oeuvres compl. p. 24

et 30). Функція $\sum\left(\frac{1}{x}\right)$ названа через Абеля Lx є першою функцією переступною, яка приходить в рахунку ріжничковім, є се функція такої самої ваги в рахунку ріжничковім як $\int \frac{dx}{x}$ в рахунку інтегральнім.

Автор зачинає представлением єї в видї ряду і принявши що

$$(1)$$

$$L(a+x) = a + \beta x + \gamma x(x-1) + \delta x(x-1)(x-2) + \epsilon x(x-1)(x-2)(x-3) + \dots$$

находить через ріжничковане вартости на a, β, γ, \dots , через що

$$L(a+x) \text{ прийме вид:} \quad (2)$$

$$L(a+x) = La + \frac{x}{a} - \frac{x(x-1)}{2a(a+1)} + \frac{x(x-1)(x-2)}{3a(a+1)(a+2)} - \frac{x(x-1)(x-2)(x-3)}{4a(a+1)(a+2)(a+3)} + \dots$$

Наколи за x возьмемо число ціле, тоді ряд сей буде мати скінчене число членів, а если будемо знали вартість $L(a)$, то будем знати так само і $L(a+n)$, де n є число ціле додатне.

І так, коли в взорі тім підставимо по черзі $x = 1, 2, 3$ і т. д., то знаючи вартість $L(a)$ для всіх величин на a , від $a = 1$ до $a = 2$, знайдемо $L(a)$ для всіх прочих вартостей на a . [Позаяк функція $\sum \left(\frac{1}{x}\right) = Lx$ має одну величину постійну довільну, то для якоїсь даної вартости на a буде мож за ню підставити яку небудь вартість функції $L(a)$, прим. $L(1) = 0$, тоді з нашого взора (2) дістанемо: $L(0) = -\infty$, $L(a) = -\infty$].

Щоби найти $L(a)$ від $a = 1$ до $a = 2$, треба взір (2) представити в відповіднім виді:

$$L(1+\omega) = \frac{\omega}{\omega+1} + (S_2-1)\omega - (S_3-1)\omega^2 + (S_4-1)\omega^3 - \dots$$

$$\text{де } S_n = 1 + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} + \frac{1}{4^n} + \dots;$$

кладучи $-\omega$ на місце ω дістанемо (3)

$$L(1-\omega) = \frac{\omega}{\omega-1} - (S_2-1)\omega - (S_3-1)\omega^2 - (S_4-1)\omega^3 + \dots$$

$$\text{а позаяк: } L(2-\omega) = L(1-\omega) + \frac{1}{1-\omega}, \quad \text{то:}$$

$$L(2-\omega) = 1 - (S_2-1)\omega - (S_3-1)\omega^2 - (S_4-1)\omega^3 - \dots$$

Взори (3) мають важне застосованє при обчисленю рядів. Бо позаяк $S\varphi(x) = S\varphi(x+1)$, то буде мож найти суму всяких рядів, котрих член загальний є φx , наколи знаємо $S\varphi x$.

Обчислім для приміру суму ряду гармонічного при помочи функції $L(x)$:

$$\frac{a}{b} + \frac{a}{b+c} + \frac{a}{b+2c} + \dots + \frac{a}{b+cx} = S\left(\frac{a}{b+cx}\right) = P$$

$$\text{маємо } P = \sum \left(\frac{a}{b+c+cx}\right) = a \sum \left(\frac{1}{b+c+cx}\right).$$

$$\text{Положим } b+c+cx = cy, \text{ то } P = \frac{a}{c} \sum \left(\frac{1}{y}\right) = C + \frac{a}{c} L(y)$$

$$P = C + \frac{a}{c} L\left(\frac{b+c}{c} + x\right). \text{ Щоби означити } C, \text{ положим } x = 0,$$

$$\text{тоді } P = \frac{a}{b}, \text{ а з відси: } \frac{a}{b} = C + \frac{a}{c} L\left(\frac{b+c}{c}\right), \text{ отже:}$$

$$P = \frac{a}{b} + \frac{a}{c} \left[L\left(\frac{b+c}{c} + x\right) - L\left(\frac{b+c}{c}\right) \right];$$

для $a = 1$, $b = 1$, $c = 2$ буде:

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{1+2x} = 1 + \frac{1}{2} L\left(x + \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2} L\left(\frac{3}{2}\right).$$

Функція $L(1+a)$ дасть ся представити при помочи інтегралу:

$$L(1+a) = \int_0^1 \frac{x^a - 1}{x - 1} dx$$

кладучи $x^{a'}$ на місце x і називаючи $aa' = m$, дістанемо:

$$L\left(1 + \frac{m}{a'}\right) = a' \int_0^1 \frac{x^m - 1}{x^{a'} - 1} x^{a'-1} dx$$

а взір сей говорить, що доки y в якою небудь величнною дійсною, то $L(y)$ дасть ся все виразити через функції альгебраїчні, лбогаритмічні і колові, бо інтеграл $\int \frac{x^m - 1}{x^{a'} - 1} x^{a'-1} dx$ дасть ся для цілковитих вартостей a' і m представити при помочи функцій альгебраїчних, лбогаритмічних і колових.

Цікаві суть також деякі прикмети тої функції; і так:

$$L\left(\frac{1}{a}\right) + L\left(\frac{2}{a}\right) + L\left(\frac{3}{a}\right) + \dots + L\left(\frac{a-1}{a}\right) = a \log\left(\frac{1}{a}\right)$$

$$2L(2a) = 2 \log 2 + L(a) + L\left(a + \frac{1}{2}\right)$$

$$L(na) = \log n + \frac{1}{n} \left[L(a) + L\left(a + \frac{1}{n}\right) + \dots + L\left(a + \frac{n-1}{n}\right) \right]$$

і т. д.

Різничкуючи поступенно функцію $\sum\left(\frac{1}{a}\right)$ дістанемо:

$$\frac{d \sum\left(\frac{1}{a}\right)}{da} = \frac{\sum\left(d \frac{1}{a}\right)}{da} = - \sum \frac{1}{a^2}$$

$$\frac{d^2 \sum \frac{1}{a}}{da^2} = \frac{\sum d^2 \left(\frac{1}{a}\right)}{da^2} = + 2 \sum \frac{1}{a^3}$$

$$\frac{d^n \sum \frac{1}{a}}{da^n} = \frac{\sum d^n \left(\frac{1}{a}\right)}{da^n} = \pm 2.3.4 \dots n \sum \frac{1}{a^{n+1}}$$

де знак $+$ буде, коли n паристе, а $-$, коли непаристе.

То і на відворот:

$$\sum \frac{1}{a^2} = \frac{d \sum \frac{1}{a}}{da}, \quad \sum \frac{1}{a^3} = \frac{d^2 \sum \frac{1}{a}}{da^2} \text{ і т. д.}$$

Ті всі функції переступні виспорядні мож представити при помочи інтегралів означених:

Було, що:

$$\sum \frac{1}{a} = La = \int_0^1 \frac{x^{a-1} - 1}{x-1} dx;$$

різничкуючи се зі згляду на a дістанемо:

$$\sum \frac{1}{a^2} = - \int_0^1 \frac{x^{a-1} \ln x}{x-1} dx \quad \text{де } \ln x = \int \frac{dx}{x}$$

$$\sum \frac{1}{a^3} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^{a-1} (\ln x)^2}{x-1} dx \quad \text{і т. д.}$$

$$\sum \frac{1}{a^\alpha} = \pm \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \alpha} \int_0^1 \frac{x^{a-1} (\ln x)^{\alpha-1}}{x-1} dx$$

або:

$$\sum \frac{1}{a^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^1 \frac{x^{a-1} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\alpha-1}}{x-1} dx \quad (\Gamma \text{ функція Euler'a})$$

найшовши сталу інтегрованя і вставивши в посліднім взорі одержимо:

$$\sum \frac{1}{a^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^1 \frac{x^{a-1} - 1}{x-1} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\alpha-1} dx$$

2. Інтеграл скінчений $\sum^n \varphi x$ виразити через інтеграл означений поодинокий. (Oeuvres compl. II. 45).

Після Parseval'a можна інтеграл скінчений $\sum^n \varphi x$ виразити через інтеграл означений подвійний.

Абель представляє той сам інтеграл $\sum^n \varphi x$ при помочи інтегралу означеного поодинокого.

Він надає функції φx вид:

$$\varphi x = \int e^{xy} f v. dv \quad (1)$$

де інтеграл береться поміж двома якимись границями v незалежними від x , fv означає функцію v залежну від виду φx .

Інтегруючи обі сторони для $\Delta x = 1$ дістанемо:

$$\Sigma \varphi x = \int e^{vx} \frac{fv}{e^v - 1} dv$$

з додатком сталої інтегрування. А по n -кратнім інтегруванню одержимо:

$$\Sigma^n \varphi x = \int e^{vx} \frac{fv}{(e^v - 1)^n} dx \quad (2)$$

з додатком:

$$C + C_1 + C_2 x^2 + \dots + C_{n-1} x^{n-1},$$

де C, C_1, C_2 , суть сталими інтегрування.

$\frac{1}{(e^v - 1)^n}$ дасть ся представити в виді:

$$\frac{1}{(e^v - 1)^n} = (-1)^{n-1} \left(A_{0,n} p + A_{1,n} \frac{dp}{dx} + A_{2,n} \frac{d^2 p}{dv^2} + \dots + A_{n-1,n} \frac{d^{n-1} p}{dv^{n-1}} \right).$$

Різничкуючи се рівнянє одержимо взори на сочинники: $A_{0,n}, A_{1,n}$ і т. д.

$$A_{0,n} = 1, \quad A_{1,n} = \sum \frac{1}{n}, \quad A_{2,n} = \sum \left(\frac{1}{n} \sum \frac{1}{n} \right),$$

$$A_{3,n} = \sum \left[\frac{1}{n} \sum \left(\frac{1}{n} \sum \frac{1}{n} \right) \right]$$

$$A_{n,n+1} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n-2} \dots \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1}, \quad A_{0,1} = \frac{1}{\Gamma(n+1)}.$$

А що після Legendre'a (Exerc. de calc. int. Т. II. p. 189).

$$\frac{1}{e^v - 1} = \frac{1}{v} - \frac{1}{2} + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt \sin dt}{e^{2\pi t} - 1}$$

протє для n паристого

$$\frac{d^n p}{dv^n} = \frac{2 \cdot 3 \dots n}{v^{n+1}} - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^n dt \cos vt}{e^{2\pi t} - 1}$$

для n непаристого будемо мати знак $-$ і $\sin vt$ місто $\cos vt$. Інтеграл $\int e^{vx} fv \sin vt dv$ найдемо кладучи в рівнянню (1) за x раз $x + ti$, другий раз $x - ti$; дістанемо іменно:

$$\int e^{vx} \cdot \sin vt \cdot fv \cdot dv = \frac{\varphi(x + ti) - \varphi(x - ti)}{2i}$$

а так само:

$$\int e^{vx} \cdot \cos vt \cdot fv \cdot dv = \frac{\varphi(x + ti) + \varphi(x - ti)}{2}$$

узгляднвши при тім

$$\int \varphi x \, dx = \int e^{vx} fv \frac{dv}{v^3}$$

дістанемо по підставленю:

$$\sum^n \varphi x = A_{n-1, n} \Gamma(n) \int \varphi x \, dx^n - A_{n-2, n} \Gamma(n-1) \int \varphi x \, dx^{n+1} + \dots +$$

$$+ (-1)^{n-1} \int \varphi x \, dx + (-1)^n \frac{1}{2} \varphi x$$

$$+ 2(-1)^{n-1} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{P \cdot dt}{e^{2\pi t} - 1} \frac{\varphi(x + ti) - \varphi(x - ti)}{2i} +$$

$$+ 2(-1)^{n-1} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{Q \cdot dt}{e^{\pi t} - 1} \frac{\varphi(x + ti) + \varphi(x - ti)}{2}$$

де: $P = A_{0, n} - A_{2, n} t^2 + A_{4, n} t^4 - \dots$

а: $Q = A_{1, n} - A_{3, n} t^3 + A_{5, n} t^5 - \dots$

Взором (3) представлений є інтеграл скінчений $\sum^n \varphi x$ при помочи інтеграла означеного поодинокого.

3. В розвідці:

Визначні прикмети функції $y = \varphi x$, означеної рівнанем:

$$fy \cdot dy - dx \sqrt{(a - y)(a_1 - y)(a_2 - y) \dots (a_m - y)} = 0$$

де fy означає якунебудь функцію y , що не стає ся зером ані безконечностию для $y = a, a_1, a_2, \dots, a_m$. (Oeuvres compl. II, 51), — доказує автор, що функція φx є функцією періодичною о періоді $2a$ означенім рівнанем:

$$\alpha = \int \frac{f(y) dy}{\sqrt{\psi y}}$$

де отже α означає вартість x відповідаючу вартості $y = a$.

$$\varphi(v) = \varphi(v + 2n\alpha + 2n_1\alpha_1 + 2n_2\alpha_2 + \dots + 2n_m\alpha_m)$$

де $n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_m = 0$

а де $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ і т. д. суть вартостями x для $y = a_1, a_2, \dots, a_m$.

4. Теорія функцій творячих (génératrice) і визначаючих (determinante). (Oeuvres compl. II. 77).

Если $\varphi(x, y, z)$ представляє якунебудь функцію змінних x, y, z , то мож найти функцію $f(u, v, p)$ таку, щоби :

$$\varphi(x, y, z) = \int e^{xu+yv+zp} f(u, v, p) du dv dp$$

число змінних може бути якенебудь.

В рівняню тім називає автор φ функцією творячою функції f і значить єї: $\varphi(x, y, z) = fg(u, v, p)$, а f називає визначаючою функції φ і значить: $f(u, v, p) = D\varphi(x, y, z)$.

Возьмім функцію одної змінної:

$$\varphi x = \int e^{vx} f v \cdot dv$$

$$\varphi x = D\varphi x$$

$$f v = fg \cdot f v$$

так само:

$$\varphi_1 x = \int e^{vx} f_1 v dv$$

то:

$$\varphi x + \varphi_1 x = \int e^{vx} (f v + f_1 v) dv$$

отже:

$$D(\varphi x + \varphi_1 x) = f v + f_1 v$$

т. з.:

$$D(\varphi x + \varphi_1 x) = D\varphi x + D\varphi_1 x$$

так само:

$$D(\varphi x + \varphi_1 x + \varphi_2 x + \dots) = D\varphi x + D\varphi_1 x + D\varphi_2 x + \dots$$

а рівночасно:

$$fg \cdot (f v + f_1 v + f_2 v + \dots) = fg \cdot f v + fg \cdot f_1 v + fg \cdot f_2 v + \dots$$

Дальше випроваджує автор, що :

$$D \left(\frac{d^n \varphi v}{dx^n} \right) = v_n D \varphi v,$$

$$fg. (v^n f v) = \frac{d^n f x}{dx^n}$$

що :

$$D \left(\int^n \varphi x dx^n \right) = v^{-n} D \varphi x, \quad fg (v^{-n} f v) = \int^n \varphi x dx^n$$

Потім :

$$D(\Delta_\alpha^n \varphi x) = (e^{v\alpha} - 1)^n f v, \quad fg. [(e^{v\alpha} - 1)^n f v] = \Delta_\alpha^n \varphi x$$

$$D(\Sigma_\alpha^n (\varphi x)) = (e^{v\alpha} - 1)^{-n} f v, \quad fg. [(e^{v\alpha} - 1)^{-1} f v] = \Sigma_\alpha^n \varphi x$$

де α значить різницю x .

Біль вельмоє загально :

$$\delta(\varphi x) = A_{n, \alpha} \frac{d^n \varphi(x + \alpha)}{dx^n} + A_{n_1, \alpha_1} \frac{d^{n_1} \varphi(x + \alpha_1)}{dx^{n_1}} + \dots$$

то :

$$\delta(\varphi x) = \int e^{vx} \cdot f v (A_{n, \alpha} v^n \cdot e^{v\alpha} + A_{n_1, \alpha_1} v^{n_1} e^{v\alpha_1} + \dots) dx$$

отже :

$$D(\delta \varphi x) = f v \cdot (A_{n, \alpha} v^n e^{v\alpha} + A_{n_1, \alpha_1} v^{n_1} e^{v\alpha_1} + \dots).$$

Назвїм :

$$A_{n, \alpha} v^n e^{v\alpha} + A_{n_1, \alpha_1} v^{n_1} e^{v\alpha_1} + \dots = \psi(v)$$

тоді :

$$D(\delta \varphi x) = \psi(v) \cdot D \varphi x$$

а :

$$D(\delta \delta_1 \delta_2 \dots \varphi x) = \psi(v) \cdot \psi_1(v) \cdot \psi_2(v) \dots D \varphi x.$$

Теорія та є дуже придатна при розвиванню функцій на ряди.

Розвїнім для приміру $\varphi(x + a)$ при помочи різничкових сочинників φx .

Визначаюча функції $\varphi(x + a)$ є рівна $e^{va} f v$, а функції

$\frac{d^n \varphi x}{dx^n} = v^n \cdot f v$. Ходить о розвїненє e^{va} на вираженя виду

$A_n v^n$, отже буде :

$$e^{va} = 1 + va + \frac{v^2}{1.2} a^2 + \frac{v^3}{1.2.3} a^3 + \dots + \frac{v^n}{1.2.3 \dots n} a^n + \dots$$

а :

$$e^{v\alpha} \cdot fv = fv + \alpha \cdot vfv + \frac{\alpha^2}{1.2} v^2 fv + \frac{\alpha^3}{1.2.3} v^3 fv + \dots$$

а беручи функцію творячу кожного члена сего рівняня дістанемо з увагою на :

$$fg(e^{v\alpha} \cdot fv) = \varphi(x+\alpha) \text{ і } fg(v^n fv) = \frac{d^n \varphi x}{dx^n}$$

$$\varphi(x+\alpha) = \varphi x + \alpha \frac{d\varphi x}{dx} + \frac{\alpha^2}{1.2} \frac{d^2 \varphi x}{dx^2} + \dots$$

форма відома нам з рахунку ріжничкового.

Таких примірів застосованя повншої теорії випроваджує автор більше.

Дальше є пару розвідок, в яких автор старає ся ріжні функції виразити при помочи інтегралів означених пр.:

5. Виразити $\varphi(x+yi) + \varphi(x-yi)$ через інтеграл означений. (Oeuvr. compl. II. 222).

Часть дійсну сеї суми $\varphi(x+yi) + \varphi(x-yi)$ можна на случай, коли φ є функцією алыгебраичною, логаритмічною, виложничною або коловою, представити в видї дійсним і скінченим, та не мож сего зробити в случаю загальнім. За се мож саму суму представити при помочи означеного інтеграла :

Коли $\varphi(x+yi)$ і $\varphi(x-yi)$ розвинемо після взору Taylor'a, то дістанемо на суму :

$$\varphi(x+yi) + \varphi(x-yi) = 2 \left(\varphi x - \frac{\varphi''x}{1.2} y^2 + \frac{\varphi''''x}{1.2.3.4} y^4 - \dots \right) \quad (1)$$

Щоби найти суму сего ряду, возьмім під увагу :

$$\varphi(x+t) = \varphi x + t \cdot \varphi'x + \frac{t^2}{2} \varphi''x + \frac{t^3}{2.3} \varphi'''x + \dots$$

Помноживши обі сторони рівняня через $e^{-v^2 t^2}$ та інтегруючи від $t = -\infty$ до $t = +\infty$ одержимо :

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x+t) e^{-v^2 t^2} dt = \\ & = \varphi x \int_{-\infty}^{\infty} e^{-v^2 t^2} dt + \varphi'x \int_{-\infty}^{\infty} e^{-v^2 t^2} \cdot t dt + \frac{1}{2} \varphi''x \int_{-\infty}^{\infty} e^{-v^2 t^2} \cdot t^2 dt + \dots \quad (2) \end{aligned}$$

а що :

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-v^2 t^2} t^{2n+1} dt = 0$$

проте остануть самі парні і різнячки функції φx . Інтеграл з парними виложниками при t будуть мати вид:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-v^2 t^2} \cdot t^{2n} dt = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1) \sqrt{\pi}}{2^n v^{2n+1}} = \frac{\sqrt{\pi}}{v^{2n+1}} \cdot A_n$$

По підставленню вартостей за них в рівняню (2) одержимо:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x+t) e^{-v^2 t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{v} \left(\varphi x + \frac{A_1}{2} \frac{\varphi'' x}{v^2} + \frac{A_2}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot \frac{\varphi'''' x}{x^4} + \cdots \right) \quad (3)$$

Помноживши се через $e^{-v^2 y^2} \cdot v \cdot dv$ і з'інтегрувавши від $v = -\infty$ до $+\infty$ дістанемо остаточно:

$$\frac{2y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} v \cdot dv \cdot e^{-v^2 y^2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x+t) e^{-v^2 t^2} dt = 2 \left(\varphi x - \frac{\varphi'' x}{2} \cdot y^2 + \frac{\varphi'''' x}{2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot y^4 \cdots \right)$$

Другий член сего рівняня є рівний:

$$(\varphi x + y i) + \varphi(x - y i)$$

отже:

$$\varphi(x + y i) + \varphi(x - y i) = \frac{2y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} v dv \cdot e^{-v^2 y^2} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x+t) e^{-v^2 t^2} dt$$

дасть суму $\varphi(x + y i) + \varphi(x - y i)$ виражену означеним інтегралом.

6. Числа Bernoulli'ого виражені при помочи означених інтегралів і випроваджене звідси виражене скінченного інтегралу $\Sigma \varphi x$. (Oeuvr. compl. II. 224).

Числа Бернулього суть то сочинники $A_1, A_2, A_3 \cdots$ в розв'язанню функції $1 - \frac{u}{2} \cot \frac{u}{2}$ на ряд після ростучих степеней u :

$$1 - \frac{u}{2} \cot \frac{u}{2} = A_1 \frac{u^2}{2} + A_2 \frac{u^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + A_n \frac{u^{2n}}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots 2n}$$

Вартости тих сочинників суть:

$$\frac{A_n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 2n} = \frac{1}{2^{2n-1} \pi^{2n}} \left(1 + \frac{1}{2^{2n}} + \frac{1}{3^{2n}} + \cdots \right)$$

Возмім на увагу інтеграл:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t^{2n-1} dt}{e^t + 1}$$

Розвинувши його знаменник на ряд дістанемо :

$$\int \frac{t^{2n-1} dt}{e^t} = \int e^{-t} t^{2n-1} dt + \int e^{-2t} t^{2n-1} dt + \dots + \int e^{-kt} t^{2n-1} dt + \dots$$

а позаяк :

$$\int_0^{\frac{1}{0}} e^{-kt} t^{2n-1} dt = \frac{\Gamma(2n)}{k^{2n}}$$

проте :

$$\int_0^{\frac{1}{0}} \frac{t^{2n-1} dt}{e^t - 1} = \Gamma(2n) \left(1 + \frac{1}{2^{2n}} + \frac{1}{3^{2n}} + \dots \right) = \frac{\Gamma(2n) \cdot 2^{2n-1} \cdot \pi^{2n}}{1.2.3 \dots 2n} \cdot A_n$$

отже :

$$A_n = \frac{2n}{2^{2n-1}} \int_0^{\frac{1}{0}} \frac{t^{2n-1} dt}{e^{\pi t} - 1}$$

При помочи послідного вираження мож функцію $\Sigma \varphi x$ виразити означеним інтегралом.

$$\Sigma \varphi x = \int \varphi x dx - \frac{1}{2} \varphi x + A_1 \frac{\varphi' x}{1.2} - A_2 \frac{\varphi''' x}{1.2.3.4} + A_3 \frac{\varphi^v x}{1.2.3.4.5.6} - \dots$$

Підставивши за A_1, A_2, A_3, \dots вартости дістанемо (винявши

перед скобки $\int_0^{\frac{1}{0}} \frac{dt}{e^{\pi t} - 1}$):

$$\Sigma \varphi x = \int \varphi x dx - \frac{1}{2} \varphi x + \int_0^{\frac{1}{0}} \frac{dt}{e^{\pi t} - 1} \left(\varphi' x \frac{t}{2} - \frac{\varphi''' x}{1.2.3} \frac{t^3}{2^3} + \frac{\varphi^v x}{1.2.3.4.5} \frac{t^5}{2^5} + \dots \right)$$

а що :

$$\varphi' x \frac{t}{2} - \frac{\varphi''' x}{1.2.3} \frac{t^3}{2^3} + \frac{\varphi^v x}{1.2.3.4.5} \frac{t^5}{2^5} - \dots$$

$$= \frac{1}{2i} \left[\varphi \left(x + \frac{t}{2} i \right) - \varphi \left(x - \frac{t}{2} i \right) \right]$$

проте $\Sigma \varphi x$ виразить ся рівнянем :

$$\Sigma \varphi x = \int \varphi x dx - \frac{1}{2} \varphi x + \int_0^{\frac{1}{0}} \frac{dt}{e^{\pi t} - 1} \frac{\varphi \left(x + \frac{t}{2} i \right) - \varphi \left(x - \frac{t}{2} i \right)}{2i}$$

Суть також розвідки, в яких Абель подає способи інтегрування деяких рівнянь різнничкових. Пр.:

7. Інтегроване рівняння різнничкового $dy = (p + qy + ry^2) dx = 0$ де $p, q, i r$ суть функціями самого y . (Oeuvr. compl. II. 229).

Рівняне різнничкове: $dy = (p + qy + ry^2) dx = 0$ (1) перейде через підставлене $y = zr'$ на:

$$(2) \quad dz + (pe^{f_{qdx}} + re^{-f_{qdx}} z^2) dx = 0 \quad \text{т. є на рівняне}$$

$$\text{виду:} \quad dy = (P + \Theta y^2) dx$$

а се рівняне (1) дасть ся з'інтегрувати, наколи $pe^{f_{qdx}} = ar e^{-f_{qdx}}$, бо тоді

$$\frac{dz}{a+z^2} = -\frac{p}{a} e^{f_{qdx}} \cdot dx, \quad \text{отже:}$$

$$z = -\sqrt{a} \operatorname{tg} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} \int p dx \cdot e^{f_{qdx}} \right)$$

значить, що:

$$y = -\sqrt{a} \cdot e^{f_{-qdx}} \operatorname{tg} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} \int e^{f_{qdx}} \cdot p dx \right) \quad (4)$$

Через підставлене (3) перейде рівняне (1) на:

$$dy + \left[p + \frac{1}{2} \left(\frac{dr}{r dx} - \frac{dp}{p dx} \right) y + ry^2 \right] dx = 0 \quad (5)$$

а єго інтеграл на:

$$y = -\sqrt{\frac{p}{r}} \operatorname{tg} \int \sqrt{rp} dx$$

або виразивши tang функціями виложничими на:

$$y = \sqrt{-\frac{p}{r}} \cdot \frac{1 - e^{2 \int dx} \sqrt{-pr}}{1 + e^{2 \int dx} \sqrt{-pr}} \quad (6)$$

Пр. для $p = -r = \frac{1}{x}$ інтеграл сей буде $y = \frac{1 - cx^2}{1 + cx^2}$.

Та помімо сего, що — як видно в деяких случаях — через відповідне підставлене рівняне дасть ся з'інтегрувати, то всеж догіднійшим для інтегрування рівнянь є чинник інтегрующий. Коли приміром чинник інтегрующий возьмемо $z = e^x$, то рівняне (1) перейде на:

$$\frac{dr}{dx} = (p + qy^2) \frac{dr}{dy} + 2qy \quad (7)$$

Рівнянє се взагалї не є лекше до розв'язаня чим (1); та мож найти багато частных случайв, в яких рівнянє (7) дасть ся з'їнтегрувати.

Возьмїм примїром за чинник інтегруючий

$$\frac{1}{(\alpha + \beta y)^2},$$

тоді рівнянє (7) перейде на:

$$dy + \left(\frac{\alpha'}{\beta} - \frac{\beta'}{\alpha} y^2 \right) dx = 0 \quad (8)$$

де α' значить $\frac{d\alpha}{dx}$ а $\beta' = \frac{d\beta}{dx}$

причїм α і β будуть зв'язанї рівняннями:

$$\alpha' - \beta p = 0, \quad \beta' + \alpha q = 0.$$

З'їнтегрувавши (8) дістанемо:

$$\int \frac{dy}{(\alpha + \beta y)^2} + f_x = 0$$

або:

$$f_x - \frac{1}{\alpha + \beta y} = 0.$$

Щобн найти f_x , треба се послїдне рівнянє зрїжничкувати, виразити y при помочї x , тоді:

$$f'_x = -\frac{\alpha'}{\alpha\beta^2}, \quad \text{а} \quad f_x = -\int \frac{\beta'}{\alpha\beta^2} dx$$

а тоді інтеграл рівняня (8) буде:

$$\frac{1}{\beta(\alpha + \beta y)} + \int \frac{\beta'}{\alpha\beta^2} dx = 0$$

т. є.

$$y = -\frac{\alpha}{\beta} + \frac{1}{\beta^2 \left(C - \int \frac{\beta'}{\alpha\beta^2} dx \right)}$$

Застосованє чинника інтегруючого до розв'язаня рівнянь рїжничкових показує автор ще і на рівнянню:

$$(y + s) dy + (p + qy + ry^2) dx = 0$$

розв'язуючи його на кілька способів при допомозі різних чинників інтегруючих. Т. II. р. 236).

8. Умовини потрібні, щоби функція більше змінних і їх різничок скінчених, — де ті змінні суть незалежні одна від другої — була цілковитою різничкою. (Oeuvres compl. II. 9.).

Най U буде функцією, що має бути цілковитою різничкою а ΣU її інтегралом, то наколи ΣU має бути цілковитим інтегралом, тоді і $\delta \Sigma U$ також ним буде.

Наколиж:

$$U = f(x, y, z, \dots \Delta x, \Delta y, \Delta z, \dots \Delta^2 x, \Delta^2 y, \Delta^2 z, \dots)$$

то:

$$\Sigma \delta U = \Sigma \delta x \cdot P + \Sigma \delta y \cdot Q + \Sigma \delta z \cdot R + \dots + \alpha$$

де:

$$P = f_x - \Delta f'(\Delta(x - \Delta x)) + \Delta^2 f'(\Delta^2(x + 2\Delta x + \Delta^2 x)) - \dots$$

$$Q = f'_y - \Delta f'(\Delta(y - \Delta y)) + \Delta^2 f'(\Delta^2(y + 2\Delta y + \Delta^2 y)) - \dots$$

і т. д.; α означає часть поза знаком інтегрована.

Позаяк $\delta x, \delta y, \delta z, \dots$ суть незалежні, проте $\Sigma \delta x \cdot P, \Sigma \delta y \cdot Q, \Sigma \delta z \cdot R, \dots$ не будуть цілковитими інтегралами, хйба що $P = 0, Q = 0, R = 0$. А се значить, що щоби функція більше змінних і їх різничок скінчених була повною різничкою, потреба, щоби сповнили ся слідуючі рівняня:

$$0 = f'(x) - \Delta f'[\Delta(x - \Delta x)] + \Delta^2 f'[\Delta^2(x - 2\Delta x + \Delta^2 x)] - \\ - \Delta^3 f'[\Delta^3(x - 3\Delta x + 3\Delta^2 x - \Delta^3 x)] + \dots$$

$$0 = f'(y) - \Delta f'[\Delta(y - \Delta y)] + \Delta^2 f'[\Delta^2(y - 2\Delta y + \Delta^2 y)] - \\ - \Delta^3 f'[\Delta^3(y - 3\Delta y + 3\Delta^2 y - \Delta^3 y)] + \dots$$

$$0 = f'(z) - \Delta f'[\Delta(z - \Delta z)] + \Delta^2 f'[\Delta^2(z - 2\Delta z + \Delta^2 z)] - \\ - \Delta^3 f'[\Delta^3(z - 3\Delta z + 3\Delta^2 z - \Delta^3 z)] + \dots$$

і т. д.

Се суть умовини конечні, а як автор дальше доказує, разом і достаточні.

Рівняня ті випроваджує автор ще і другий раз як умовини потрібні, щоби інтеграл функції даної був maximum або minimum. Є се іменно предметом розвідки: **Про maxima і minima інтегралів.** (Oeuvres compl. II. р. 1.). Там окрім випровадження повеших взорів, є ще і два частні приміри яко застосоване виведених рівнянь.

Закінченє.

Так перейшов я по черзі всі праці Абеля, великі обємом, багаті різнородністю обсягів, а перворядного значіння в історії розвою математики. Вже перші єго праці з обсягу розв'язування рівнянь альгебраїчних мають епохальне значінє в альгебрі. Квестія, яка через два століття оставала непорішеною, а якій посвятили свої праці майже всі визначні математики XVIII. столітя, як Euler, Bézout, Lagrange, Vandermonde, Malfatti і иньші, квестія альгебраїчного розв'язання рівняня пятого степеня, вийшла тепер на нову дорогу. Стало ясно, що рівняня степеня висшого чим четвертий, альгебраїчно розв'язати не дадуть ся, а тим самим і дослїди на тім поли мусли звернутись в иньшій напрямі; треба було шукати иньших функцій, що при їх помочи рівняне пятого степеня дало ся розв'язати. Се й довело до розв'язання при помочи функцій еліптичних.

Теорія груп абелевих дала новий спосіб розв'язування рівнянь альгебраїчних, а дальше можність пізнавання, коли рівняне дасть ся розв'язати альгебраїчно. Теорія ся, піднята пізнійше через Galois, розвинула ся широко і отворила нове поле до дослїдів над функціями аналітичними. Не менше цінні є праці Абеля, що відносять ся до функцій еліптичних, а період 1815 – 1829, на який припадає час твореня Абеля, мож безперечно назвати найважнійшим в розвою теорії функцій еліптичних. Прикмети функцій еліптичних, випосажених теоремом множеня зложеного, по части доказані, а по части лиш (інтуїційно) віщо перечуті Абелем, стались товчком до дальших праць в тім напрямі Jacobi, Hermite'a, Jouberta, Greenhilla, Webera, а передовсім Kroneckera, який не лише доказав теорему Абля, але відкрив глубші відносини сеї науки до альгебри і теорії чисел. В тім множеню зложенім беруть початок „числа альгебраїчні“, які доперва в послїдних часах стали загальним добром ширших кругів математичних. Відкрите альгебраїчної природи рівняня, відносячого ся до поділу періодів функцій еліптичних, основує ся на відношенях поміж коренями того рівняня, відношенях, які відкрив Абель.

Єго дослїди над функціями переступними суть підставою до цілої нової теорії функцій і інтегралів абелевих, а єго славне твердженє о сумі інтегралів абелевих є найбільше основним твердженєм в цілій теорії функцій альгебраїчних і їх інтегралів. З ним в'язуть ся праці Riemanna і ціла теорія поверхний ріманівських,

дальше праці Eulera, Weierstrassa, Neumanna, а також Clebscha і Gordana, який щасливо зробив *ту* початок до сполуки понять геометричних і аналітичних.

В загалі у всіх галузях аналізу слідний вплив сего великого чоловіка.

Перемишль, вересень 1902. — май 1903.

Важніші похибки друкарки:

НА СТОРОНІ	СТРІЧКА	ЗАМІСТЬ	МАЄ БУТИ
2.	11 з гори	форм	форми
5.	9 з долини	не треба слова »кому«, —	
8.	2 »	Rys	Phys.
17.	2 »	Гейбрай	Дебрай
18.	замість $a\mu_1, a\mu_2$	всюда має бути $\delta\mu_1, \delta\mu_2$.	
21.	8 »	зовсім	майже зовсім
25.	3 з гори	Ненгі	Ненгі
28.	11 з долини	не треба зовсім:	»КОВОЛОМ В«.
33.	7 »	»	»ЗВ. КОВОЛОМ«.



И.39.599

20

243.

МИКОЛА ГЕНРИХ АБЕЛЬ

І ЕГО ЗНАЧІНЄ В МАТЕМАТИЦІ.

(З НАГОДИ СТОЛІТНИХ РОКОВИН ЕГО УРОДИН).

Написав

Клим Глєбовицкій.

Відбитка з „Збірника секції математично-природописно-лікарської Наукового Товариства ім. Шевченка“ том IX.

У ЛЬВОВІ, 1903.

Накладом Товариства.

З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка
під зарядом К. Беднарського.

2004